



L'EFFICACITÉ À TOUTE ÉPREUVE



**FORTE
APPÉTENCE**



EFFICACITÉ PROUVÉE



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

Découvrez
le processus
en vidéo



Le processus de fabrication de
LIPHATECH



FORTE APPÉTENCE

Céréales de haute qualité. Forme étudiée avec plusieurs angles d'attaque pour une meilleure consommation par les rongeurs



**PROTECTION LONGUE
DURÉE**

**TRES RESISTANT À
L'HUMIDITÉ**

LA SOLUTION POUR LUTTER

- ▶ Contre les Rats et notamment le Surmulot
- ▶ Autour des bâtiments, idéal en lieux humides
- ▶ Utilisable également aux abords des infrastructures

LE PRODUIT



RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	GENCOD	PEREMPTION	PAL
80005533	seau de 5 kg	3495694015336	3 ans	50 seaux



Utilisation obligatoire en POSTE D'APPÂTAGE

CONSEILS - BONNES PRATIQUES



➤ AVANT LE TRAITEMENT : rendre inaccessibles les sources de nourriture

➤ MISE EN PLACE DU TRAITEMENT

- Bien lire les indications et instructions sur les étiquettes du produit avant utilisation
- Placer les appâts dans des **postes d'appâtage sécurisés**
- Ne pas poser le poste d'appâtage dans un angle afin que le rongeur puisse toujours voir la sortie.
- Positionner les postes d'appâtage au **plus près des indices de présences** (crottes, traces de passage...)



-  • Faire « **une ceinture de protection** » avec les postes, autour des bâtiments pour éviter que les rongeurs pénètrent à l'intérieur.

- 1 Le rongeur entre dans le poste d'appâtage.
- 2 Il consomme l'appât.
- 3 Il ressort et succombe 4 à 10 jours plus tard.

➤ SUIVI DU TRAITEMENT

- Inspecter les postes d'appâtage au minimum tous les 2 à 3 jours si présence de souris et tous les 5 à 7 jours si présence de rats après le début du traitement, puis une fois par semaine tant que les appâts sont consommés.
- Recharger les postes d'appâtage avec la quantité d'appâts nécessaire dans le respect des doses d'emploi autorisées.

-  • Il est primordial de veiller à la **disponibilité de l'appât** (le bon produit à la bonne dose au bon endroit) de façon à cibler toute la population.

➤ VIGILANCE ET OBSERVATION POUR EVITER TOUTE NOUVELLE INFESTATION

- Eliminer les refuges, couper les végétaux sur une largeur d'un mètre autour des bâtiments, tailler les arbres
- Enlever tout ce qui peut servir d'abri potentiel
- Faire les travaux nécessaires pour empêcher l'entrée et l'installation des rongeurs



Le port des gants est obligatoire à chaque étape du traitement.



Se laver les mains après chaque manipulation.

 Retrouvez tous nos tutos et vidéos sur [BIAGRO.FR](https://www.biagro.fr)

MENTIONS RÉGLEMENTAIRES :

Nom homologué : FRAP[®] BLOCK[®] - AMM N°FR-2012-0499 - Diféthialone à 25mg/kg - N° CAS 104653-34-1. CLASSEMENT : Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2), Danger pour le milieu aquatique - Toxicité chronique (catégorie 3)
PRODUITS RODONTICIDES. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.