

HaifaStim™ eEnergy

Produit composé d'un hydrolysate enzymatique concentré de protéines et de composés naturels stimulant la plante

Composition

Azote (N) organique	10 %
Azote (N) organique soluble eau	10 %
Matière organique totale d'origine biologique.....	69 %
Carbone organique total (TOC) d'origine biologique	30 %
Acides aminés libres	10 %
Peptides et acides aminés totaux	46 %
Densité (20°C) kg/L.....	1,25
Ec mS/cm (0,1 %).....	0,42
pH (solution 10 %)	6,5



Contient des composés organiques actifs au niveau biochimique qui améliorent le métabolisme de la plante.

Conditionnement

- Flacon 1 L (1,25 kg) – Carton de 20 bidons – palette de 42 cartons (840 L)

Stockage et manipulation

- Stocker dans un endroit sec et bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil
- Température conseillée de stockage : 5°C - 30°C

Utilisation

Produit destiné à la nutrigration™ et à des applications foliaires. Accélère les processus physiologiques dans la plante et booste la croissance.



Amélioration de
l'efficacité de l'engrais



Engrais
foliaire



Utilisable en
Agriculture Biologique

Produit utilisable en agriculture biologique, conformément au Règlement d'Exécution (UE) n°2021/1165 (Annexes du Règlement (UE) n°2018/848) – AMM n° 1230393



Haifa France – 1 127, avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com

Préconisation d'emploi

Cultures	Dose maximale d'apport	Nombre maximum d'apports par an	Application	Epoque d'apport / stades d'application
Toutes cultures (serres et plein champ)	3 L/ha	4	Pulvérisation foliaire	Tout au long du cycle cultural

Application foliaire : 2-3 L/ha, volume bouillie 600-1 000 L/ha, 3-4 traitements durant la période de croissance.

- Vigne et raisins de table : début de la croissance végétative ; pré-floraison à développement complet des baies.
- Pomme et poire : différenciation des bourgeons, initiation et développement ; fin floraison à chute des feuilles.
- Kiwi : du départ végétation à la pré-floraison ; fin floraison à chute des feuilles.
- Pêche, abricot, prune, cerise : fin de floraison à chute des feuilles.
- Agrumes : début de la croissance végétative à la floraison.
- Olive : avant fleur pour accroître le développement des fruits.
- Fraise : enracinement ; début de récolte.
- Tomates, aubergines, poivrons, concombres, courgettes : après plantation ; début de récolte.
- Melon, pastèque : toute la saison.
- Légumes-feuilles : à la plantation pour accroître le développement des feuilles.
- Betteraves sucrières : de la plantule à la fin du développement foliaire.
- Pomme de terre : de l'émergence au développement complet du tubercule.
- Blé, orge : du tallage à épiaison

Conditions d'emploi

- Port de gants et de vêtements de protection adaptés ainsi que d'EPI appropriés en fonction du type et du classement de la préparation.
- Ne pas appliquer le produit après la formation des parties consommables et ne pas appliquer le produit sur les cultures dont les parties consommables peuvent entrer en contact avec le sol.

Mise à jour : novembre 2023



Haifa France – 1 127, avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com