

# GENOXONE® ZXE

TRICLOPYR 103,6 G/L + 2,4D 93G/L



SOUCHES



RONCES



CHARDONS



ORTIES



RUMEX

## H E R B I C I D E

### LE PRINTEMPS DU DÉBROUSSAILLANT

#### BÉNÉFICES

- Gains de m<sup>2</sup> utiles
- Gains de productivité
- Rapport Qualité/Prix
- Efficacité longue durée

#### AVANTAGES

- Sélectif des graminées
- Large spectre
- Récolte possible l'année du traitement
- Conditionnement 5 L

**UPL France** - Tour Voltaire - 2<sup>ème</sup> étage - 1 place des Degrés - 92800 PUTEAUX  
Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : [contact.uplfrance@upl-ltd.com](mailto:contact.uplfrance@upl-ltd.com)

En savoir plus sur :

**[www.uplcorp.com/fr](http://www.uplcorp.com/fr)**



## Caractéristiques :

Genoxone® ZXE est un herbicide débroussaillant. Sélectif des graminées, il agit sur les dicotylédones, annuelles, bisannuelles et vivaces.

## SPECTRE D'EFFICACITÉ :

| ESPÈCES                              | 1,25L/HL |
|--------------------------------------|----------|
| AJONC D'EUROPE                       | ●        |
| AUBÉPINE ET JONC                     | ●        |
| BOULEAU                              | ●        |
| BRUYÈRE                              | ●        |
| BUGLE                                | ●        |
| CALLUNE COMMUNE                      | ●        |
| CHARDON DES CHAMPS                   | ●        |
| CHARDON ROLAND                       | ●        |
| CHARME                               | ●        |
| EPILOBE                              | ●        |
| EPINE NOIRE                          | ●        |
| EUPATOIRE CHANVRINE                  | ●        |
| FRAMBOISIER                          | ●        |
| FRÊNE COMMUN                         | ●        |
| GENÊTS                               | ●        |
| GRANDE BERCE                         | ●        |
| MILLEPERTUIS                         | ●        |
| ONAGRE                               | ●        |
| ORTIE DIOÏQUE                        | ●        |
| PEUPLIER                             | ●        |
| ROBINIER FAUX ACACIA                 | ●        |
| RONCE                                | ●        |
| RUMEX                                | ●        |
| SUREAU YEBLE                         | ●        |
| LA PLUPART DES DICOTYLÉDONES VIVACES | ●        |

## EFFICACITÉ

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| TRÈS BONNE | ● 95 à 100 % à T+12 mois |
| BONNE      | ● 85 à 95 % à T+12 mois  |
| MOYENNE    | ● < 85 % à T+12 mois     |

## Composition :

- Triclopyr 103,6 g/L + 2,4D 93g/L, la synergie de deux molécules permet un apport raisonnable de matières actives tout en ayant une efficacité optimale. La complémentarité d'action et des spectres des deux molécules permet d'éliminer le maximum des adventices nuisibles visées.

## Pourquoi le triclopyr et le 2,4D sont sous forme d'ester ?

- Bonne répartition du produit sur les végétaux traités.
- Absorption du produit rapide et optimale.
- Circulation dans la sève maximale.

## USAGES AUTORISÉS :

| USAGES HOMOLOGUÉS SUR CULTURES DE RÉFÉRENCE | DOSES AUTORISÉES                    | CONSEILS D'UTILISATION                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dévitilisation des souches                  | 325 ml/m <sup>2</sup>               | En badigeonnage, possible toute l'année                                                                                                                                                 |
| Prairies<br>Contrôle des Broussailles       | 12,5 L/ha                           | Prairies permanentes<br>Plantes en croissance végétative avec un feuillage suffisamment développé. Uniquement en traitement localisé sur un maximum de 20% de la surface de la prairie. |
| Prairies<br>Désherbage en plein champ       | 4,6 L/ha<br>Dose conseillée : 3L/ha | Uniquement sur plantes en croissance végétative en feuillage suffisamment développé                                                                                                     |

Les usages traitements généraux autorisent le désherbage non sélectif des **zones agricoles non cultivées** telles que les cours et les abords de fermes, les dessertes des bâtiments d'exploitation, les chemins d'accès et abords des cultures... tant que ladite zone/ l'exploitation n'est pas susceptible d'accueillir du public.

## PÉRIODES D'APPLICATION :

| JAN. | FÉV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUIL. | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | DÉC. |
|------|------|------|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|------|
|      |      |      |      |     |      |       |      |       |      |      |      |
|      |      |      |      |     |      |       |      |       |      |      |      |
|      |      |      |      |     |      |       |      |       |      |      |      |

● Hors période d'application ● Période d'application

## ÉQUIVALENCES / TRAITEMENT LOCALISÉ :

| DOSE PRODUIT | DOSE D'EAU À DILUER | SURFACE TRAITÉE     |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 1,25L        | 100L                | 1000 m <sup>2</sup> |
| 0,125L       | 10L                 | 100 m <sup>2</sup>  |
| 0,0125L      | 1L                  | 10 m <sup>2</sup>   |

Conseils d'application : Appliquer le produit par temps poussant, sur une végétation développée (20 à 40 cm) mais avant le stade graines pour les orties, avant la floraison pour les chardons et en dehors de la floraison pour les ronces et autres broussailles.

Traitement uniquement par temps calme, sans vent et entre 5 et 20°C. Eviter le traitement en cas de fort ensoleillement. Le délai de réintroduction des animaux est de 15 jours après l'application du produit.

GENOXONE®ZXE possède une ZNT aquatique de 5m.

Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté : Vêtement de protection, lunettes de protection, appareil respiratoire approprié, gants de caoutchouc épais.

UPL France est titulaire de l'agrément phytosanitaire N°9200008 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Homologation : N° 2060131. Détenteur d'AMM : Arysta Lifescience Benelux Sprl - Composition : 103,6 g/L de Triclopyr - 93 g/L de 2,4D - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>



DANGER. H226 : Liquide et vapeur inflammables. H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 : Provoque une irritation cutanée. H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. H318 : Provoque des lésions oculaires graves. H410 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**