

BARMETHA GRAMINIS 2S



% du poids	Espèces	Nb graines/m² (Dose 100kg = 282 gr/m²)
65%	Seigle fourrager HIGREEN	196
35%	Triticale JOKARI	86

Utilisations

- CIVE d’Hiver (ensilage)

Caractéristiques

- Mélange très rustique vis à vis des maladies
- Verse limitée grâce au triticale
- Récolte plus aisée
- Meilleure conservation au silo (tassement et teneur en sucre)

Espèces / Variétés


- Seigle fourrager **HIGREEN** :
 - Variété précoce à épiaison
 - Bon développement végétatif en début de cycle
 - Résistant aux maladies et viroses
 - Très productif avec une bonne teneur en MS
- Triticale **JOKARI** :
 - Variété ½ alternative
 - Précoce à épiaison
 - Peu sensible à la verse
 - Très bon comportement face aux maladies
 - Très bonne teneur en sucre et protéine



Seigle fourrager
HIGREEN



Triticale
JOKARI



BARMETHA GRAMINIS 2S



Semis :

- **Dose recommandée** : 100 kg/ha en semis précoce (avant début octobre). Augmenter la densité de semis à 120kg/ha en cas de conditions difficiles ou semis plus tardif.
- **Période** : Optimale de septembre à début octobre. Possible jusque fin octobre
- **Profondeur de semis** : 2 à 3 cm
- **Matériel** : semoir à céréales
- Rappuie de la ligne de semis indispensable (contact sol/graines)

Conduite culturale :

- **Fertilisation** :
 - P, K : conseillée si les teneurs du sol sont limitantes
 - N : 100u d'azote en reprise de végétation (Février – Mars selon la région et la Directive Nitrates en vigueur) avant le stade épi 1cm du seigle
 - S : 25u de soufre au stade fin tallage
- **Protection phytosanitaire** : néant

Récolte :

- Compromis entre le rendement biomasse et la date d'implantation optimale de la culture suivante. Une récolte au mois de mai garantira une biomasse importante mais pourra pénaliser la culture suivante (assèchement du sol, période moins pluvieuse pour la levée...)
- Destruction après récolte : mécanique (déchaumage, labour...)
- Sensibilité au gel : non gélif

