




Novicure®



FONGICIDE

Concentré de rapidité

Points Forts

- Novicure®, cuivre nouvelle génération qui combine rapidité d'action, sélectivité et rémanence. Formulation concentrée, de qualité Disperss®, pour vous garantir une facilité d'utilisation au quotidien.
- Solubilisation rapide du cuivre pour une biodisponibilité immédiate du Cu^{2+} .
- Fongicide multi-site : contribue à la prévention et à la gestion des résistances.
- Agit rapidement, haute sélectivité, protection durable.

UPL France - Tour Voltaire - 2^{ème} étage - 1 place des Degrés - 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@upl-ltd.com

www.uplcorp.com/fr



Usages et doses d'emploi homologues (traitements des parties aériennes)

	Culture	Cible	Dose d'emploi (Kg/ha)	Stade d'application	Nombre maximum d'applications	Délai avant récolte (jours)	ZNT aquatique (m)
Cultures de plein champ	Agrumes	Bactérioses	1.1	-	3	21	50
	Aubergine	Mildiou(s) Bactérioses	2.5	-	4	7	20
	Bulbes ornementaux	Bactérioses Mildiou(s)	2.0	-	4	NC	20
	Cassissier, Myrtille, Groseillier	Maladies du feuillage (Anthracnose)	1.1	Jusqu'au stade BBCH 69 OU après récolte uniquement en l'absence de fruits	5	F	50
	Cerisier	Bactérioses, <i>Coryneum</i> et <i>Polystigma</i>	1.1	Jusqu'au stade BBCH 69 OU après récolte uniquement en l'absence de fruits	3	F	50
	Concombre, Courgette, Cornichon	Mildiou(s)	2.0	-	4	NC	20
	Framboisier, Mûrier	Maladies du feuillage (Anthracnose)	1.1	Jusqu'au stade BBCH 69 OU après récolte uniquement en l'absence de fruits	5	F	50
	Haricots frais non écosés	Bactérioses	2.0	-	4	21	50
	Kiwi	Bactérioses	1.1	Jusqu'à BBCH69 ou après la récolte. Uniquement en l'absence de fruits	3	F	50
	Laitue	Bactérioses Mildiou(s)	2.0	-	4	7	20
	Melon, Pastèque, Potiron et autres Cucurbitacées à peau non comestible	Bactérioses Mildiou(s)	2.0 2.5	-	5 4	7 7	20 20
	Noisetier	Bactérioses	1.1	-	3	14	50
	Noyer	Bactérioses	1.1	Jusqu'au stade BBCH 69 OU après récolte uniquement en l'absence de fruits	3	F	50
	Oignon, Ail, Echalotte	Bactérioses Mildiou(s)	2.0	-	4	3	20
	Olivier	Bactérioses Maladies du feuillage	1.1	Jusqu'au stade BBCH 69 OU après récolte	3	F	50
	Pêcher, Abricotier, Nectarinier	Bactérioses, <i>Coryneum</i> et <i>Polystigma</i>	1.1	Jusqu'au stade BBCH 69 OU après récolte uniquement en l'absence de fruits	3	F	50
	Pommier, Poirier, Cognassier, Nashi, Pommette	Bactérioses Chancre européen Tavelure(s)	1.1	Jusqu'au stade BBCH 69 OU après récolte uniquement en l'absence de fruits	3	F	50
	Prunier	Bactérioses Cloque(s)	1.1	-	3	21	50
	Tomate de bouche	Mildiou(s) Bactérioses	2.5	-	4	3	20
	Tomate industrielle	Mildiou(s) Bactérioses	2.5	-	4	10	20
	Vigne	Mildiou(s) Bactérioses	1.875	-	5	21	50
Cultures sous abris	Aubergine	Mildiou(s) Bactérioses	1.1	-	6	7	-
	Concombre, Courgette, Cornichon	Mildiou(s) Bactérioses	1.1	-	5	3	-
	Laitue	Bactérioses Mildious	2.0	-	4	7	20
	Tomate de bouche	Mildiou(s) Bactérioses	1.1	-	6	3	-

Dispositif végétalisé permanent de 20 mètres pour les cultures de plein champ. UPL France ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres usages tels que prévus par l'arrêté du 26 mars 2014. Les limites maximales de résidus sont consultables à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides_en. Délai de rentrée : 6H en plein champ et 8H sous abris après la fin de l'application.

NPP

Natural Plant
Protection by UPL

UPL France est titulaire de l'agrément phytosanitaire N°9200008 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Homologation : N° 2160694. Détenteur d'AMM : UPL Europe Ltd - Composition : 400g/Kg (soit 40% p/p) de cuivre métal sous forme de Sulfate de Cuivre Tribasique (TBCS). Formulation : granulés dispersables (WG). Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>



ATTENTION. H302 - Nocif en cas d'ingestion, H410 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P264 - P270 - P273 - P301+ P312 - P391 - P501



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.