

Vitelice P



Engrais foliaire
complet renforcé
en Magnésium,
Zinc et Silice

ENGRAIS CE
2003 / 2003



- PHOSPHORE (P_2O_5) - 31%
- POTASSE (K_2O) - 5%
- MAGNÉSIUM (MgO) - 1,8%
- ZINC (Zn) - 1,6%
- MANGANÈSE (Mn) - 0,01%
- CUIVRE (Cu) - 0,01%
- SILITEK - 10%



VAM



GRANDES CULTURES



POMMES DE TERRE



Favorise l'équilibre
nutritionnel de la plante.



Stimule la photosynthèse
et la biosynthèse.



Renforce la résistance
aux stress abiotiques.



Renforce les propriétés
physiques des parois
et des membranes
cellulaires.



GAMME


Nutrition & Biostimulation



ESSAI SUR VIGNE (2019) - 4 RÉPÉTITIONS ET ESSAI SUR BLÉ (2019) - 4 RÉPÉTITIONS

Analyse du jus de sève.

AUGMENTATION / TNT (%)



- STIMULE LA PHOTOSYNTÈSE ET LA BIOSYNTÈSE.
- FAVORISE L'ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL.

Mg

Le magnésium est un constituant essentiel de la chlorophylle assurant la photosynthèse.

P

Rentrent dans la synthèse des acides aminés, des molécules organiques utiles à la **croissance** de la plante, des vitamines A et C et **améliorent leur transport** vers les autres organes de la plante.

K

Si

Port érigé : la plante capte plus de lumière.

Corrige les déséquilibres nutritionnels et **améliore l'assimilation** des éléments majeurs (N, P, K) et secondaires (Ca, Mg).



- RENFORCE LA RÉSISTANCE AUX STRESS ABIOTIQUES.

Mg

Favorisent la **croissance racinaire**. La plante est **moins vulnérable** à la sécheresse.

Si

P

K

Si

Activent les processus de résistance en réponse à un stimuli extérieur : Sécheresse - Gel - Salinité - Chaleur - etc.

Si

Limite fortement la toxicité aux métaux lourds.



- RENFORCE LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PAROIS CELLULAIRES ET DES MEMBRANES PLASMIQUES.

Si

Renforce la solidité de la paroi cellulaire et **améliore la cicatrisation**.

Vitelice P a un PH de 2.

Cultures	Doses	Périodes d'application	Cultures	Doses	Périodes d'application
Maïs	2 L/Ha	Du semis jusqu'au stade 8 feuilles.	Viticulture	De 3 à 6 L/Ha	Dès le stade 4 feuilles jusqu'au stade fin véraison.
Céréales	De 3 à 4 L/Ha	Dès épi à 1cm et jusqu'à la floraison.	Arboriculture	De 3 à 6 L/Ha	De la chute de pétales à début de la coloration.
Pommes de terre	De 4 à 6 L/Ha	Dès le stade 4 feuilles jusqu'au début du grossissement des tubercules.	Maraîchage	De 3 à 6 L/Ha	3-4 applications durant le cycle des cultures.

Selon le règlement (CE). 1272/2008 (CLP) - Mention de danger :

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **H314** : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **CONSEILS DE PRUDENCE** : **P280** : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P301 + P330 + P331** : EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **P303 + P361 + P353** : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. **P304 + P340** : EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut

confortablement respirer. **P305 + P351 + P338** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P501** : Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

CONDITIONNEMENT

10 litres



DANGER

Vivagro

la nature au service de vos cultures

WWW.VIVAGRO.FR

TECHNOPOLE MONTESQUIEU
5 ALLÉE JACQUES LATRILLE
33650 MARTILLAC

+33 (0)5 57 78 32 68
+33 (0)5 57 29 38 35

VITELICE P, marque déposée par VIVAGRO

COMPATIBILITÉ : Compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires couramment utilisés. Cependant, il n'est pas recommandé de mélanger ce produit avec des produits à réaction alcaline, contenant des sulfates et des huiles minérales. Il est toujours recommandé de faire un essai avant son utilisation.

MANIPULATION : Secouer avant l'emploi, tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Stocker dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes. **CONSEIL D'UTILISATION** : Ne pas traiter à des températures extrêmes qui ne répondent pas aux bonnes pratiques agricoles.