


L'ESSENTIEL AXIAL One®

L'HERBICIDE POUR MIEUX MAÎTRISER LES ADVENTICES DES CÉRÉALES EN SORTIE D'HIVER



- **Composition :** 45 g/l de pinoxaden + 5 g/l de florasulame + 11,25 g/l de cloquintocet-mexyl
- **Formulation :** EC (concentré émulsionnable) adjuvant inclus
- **Usages et doses autorisés :**
 - Désherbage
 - Blé tendre d'hiver et de printemps, seigle d'hiver, grand épeautre, triticale, orge d'hiver et orge de printemps : 1,3 l/ha
 - Blé dur d'hiver et de printemps : 1 l/ha
 - 1 application par an. Fractionnement possible sur folle-avoine et avoine à chapelets
 - En sortie d'hiver, à partir du stade début tallage (BBCH 21) des céréales et jusqu'au stade dernière feuille pointante (BBCH 37)
 - Inscrit sur la liste IFBM
- **ZNT :** 5 mètres par rapport aux points d'eau et/ou aux zones non cultivées adjacentes.
- **Délai de rentrée :** 48 h

■ CONDITIONS D'EMPLOI

Vulpin	Ray-grass	Agrostis	Folle-avoine
AXIAL One® 1 l/ha* + sulfonyleurée antigaminées à 80 % de la dose recommandée + huile ou AXIAL One® 1,3 l/ha + huile (1 l/ha sur blé dur)			AXIAL One® 1 l/ha ou 2 x 0,65 l/ha

* Respecter la dose de 1,3 l/ha sur vulpin

■ SPECTRE D'EFFICACITÉ DICOTYLÉDONES

	Sensibilité à 1,3 l/ha
Amni élevé	
Anthemis	
Bifora	
Bleuet	* **
Capselle	
Ceraiste	
Chénopode	
Coquelicot	* **
Ethuse	
Fumeterre	
Gaillet	
Géranium à feuilles rondes	
Lamier pourpre	
Lamier amplexicaule	
Matricaires	
Miroir de Vénus	
Laitue scarole	
Lampsane	
Pensée	
Ravenelle	
Renoncule des marais	
Renouées	
Repousse colza	
Repousse féverole	
Repousse tournesol	
Sanve (moutarde)	
Scandix	
Senegon commun	
Stellaire	
Véroniques	

* Au-delà du stade 4 feuilles.

** Du stade cotylédons à 4 feuilles.

Très efficace > 95 %
Efficace de 85 à 95 %

Moyennement efficace de 70 à 85 %
Efficacité insuffisante < 70 %

■ LES BÉNÉFICES


- Large spectre graminées et dicotylédones
- Souple d'emploi.
- Multicultures.
- Performances peu dépendantes des conditions climatiques.
- Pénétration rapide et efficacité renforcée avec un adjuvant intégré.
- Absence d'arrière-effets sur cultures suivantes.
- Efficacité sur graminées secondaires (dont panics, sétaires, digitaires, ...).

Renseignements Techniques **0 825 00 05 52** Service 0,15 € / min + prix appel
renseignements.techniques@syngenta.com

■ ADAPTÉ À TOUTES LES STRATÉGIES



Exemple de programmes Terres de progrès



■ EN PRATIQUE

- Dans les situations extrêmes (situation de très forte pression ou de résistance déclarée aux antigraminées), il n'est pas toujours possible d'atteindre une efficacité de 100%. Seule la combinaison de toutes les méthodes à disposition limitera l'infestation de graminées : leviers agronomiques + 2 passages d'herbicides dont au moins un à l'automne.

- **AXIAL One®** est un herbicide systémique à absorption foliaire, il doit être appliqué sur des adventices levées, en croissance active. Le respect de certaines précautions permet d'optimiser son efficacité :
 - privilégier une hygrométrie supérieure à 60 %
 - traiter sur végétation sèche
 - préférer des températures supérieures à 6 °C. Entre 2 °C et 6 °C l'activité d'**AXIAL One®** est bonne mais plus lente. Après une vague de froid, attendre quelques jours et une reprise de végétation avant de traiter.

AXIAL ONE® - Attention - H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H361d - Susceptible de nuire au fœtus. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



Syngenta France S.A. - 1228, Chemin de l'Hobit - 31790 Saint-Sauveur France.

S.A. au capital de 101 075 884 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-com. : FR 11 443 716 832.

Agrément MP02249 : distribution et application de produits phytopharmaceutiques.

En cas d'incident, appeler le numéro d'urgence Syngenta

0 800 803 264

Service & appel gratuits

AXIAL ONE® - AMM N° 2110095 - Composition : 11.25 g/l cloquintocet-mexyl * + 45 g/l pinoxaden ** + 5 g/l florasulame - P102 Tenir hors de portée des enfants. P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. SPe3 Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

* Marque enregistrée et * substance active d'une société du groupe Syngenta. ** substance active brevetée d'une société du groupe Syngenta.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <https://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.