



Oxyfertil® Liz

Pour améliorer les qualités des lisiers



- Un lisier plus homogène
- Gain de temps
- Effet assainissant sur le lisier
- Enrichissement en calcium du lisier

Les lisiers constituent la source principale de fertilisation des exploitations d'élevage. Il est important que leur utilisation soit optimisée sur l'exploitation. L'emploi de **Oxyfert[®] Liz** avant l'application au champs des lisiers permet de :

■ Obtenir un lisier plus homogène

L'incorporation d'Oxyfert[®] Liz fluidifie le lisier pour une meilleure répartition de ses composants nutritifs. Dans un lisier traditionnel, l'azote et le phosphore se concentrent dans le fond, la partie liquide contient les éléments minéraux solubles et la croûte superficielle se compose essentiellement de cellulose avec de la potasse et de l'ammoniaque. Avec Oxyfert[®] Liz, tout est homogénéisé.

■ Limiter les odeurs à l'épandage

■ Gagner du temps

Le temps de remplissage de la tonne à lisier est réduit. De plus la tonne est totalement remplie, en évitant le phénomène de moussage.

■ Limiter les phénomènes de croûtage du lisier

■ Réduire les populations de germes

	Lisier non traité	Lisier + Oxyfert [®] Liz	Lisier + Oxyfert [®] Liz	Lisier + Oxyfert [®] Liz	Réduction des populations
Escherichia coli (/g Mat Brute)	62 000	<100	<100	<100	-99%
Salmonelles (/g Mat Brute)	Absence	Absence	Absence	Absence	
Entérocoques fécaux (npp/g Mat Brute)	81 172	25 942	51 403	41 150	-68%
Date de prélèvement	Jour d'épandage	Jour d'épandage	Jour 2	Jour 6	

■ Enrichir en calcium le lisier

Mise en œuvre

Application Oxyfert[®] Liz
1 citerne 28 tonnes
par unité de 1000 m³
avec brassage



59% CaO (combiné à l'état de carbonate et d'oxyde de calcium)
IPA: 115 VN : 59
Densité : 0,7
Vrac pulsé uniquement

La fosse à lisier doit être accessible pour une citerne