

HaifaStim™ Wall-Up S

Formulation concentrée fournissant aux plantes de la silice facilement absorbée et assimilable sous forme d'acide orthosilicique, associée à du fer chélaté.

Engrais soluble

- Fer chélaté (mix EDTA – HEEDTA – DTPA).

Analyse produit (standard)

Fer (Fe) chélaté soluble eau* 5,0%

Informations complémentaires

Silice (Si) totale 20,0%
Dioxyde de silice (SiO₂) 42,8%
pH (solution à 0,1 %) 8,2
EC (solution à 0,1 %) 0,23^{+/-0,2} mS/cm



* Fer chélaté par EDTA (1,7 %), HEEDTA (0,7 %) et DTPA (1,7 %)

Une composition étudiée qui renforce la résistance de la plante aux stress abiotiques, améliore la croissance, augmente la résistance mécanique et maximise le rendement.

Conditionnement

- Sac 1 kg aluminium laminé thermoscellé – carton de 12 sacs – palette de 84 cartons (1 008 kg)
- Sac 25 kg aluminium laminé thermoscellé – palette de 50 sacs (1 250 kg)

Stockage et manipulation

- Stocker dans un emplacement sec et bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil
- Température conseillée de stockage : 5°C - 30°C

Utilisation

Nutrigation™, applications foliaires et hydroponie. Améliore le comportement de la plante face aux mauvaises conditions de croissance et renforce les mécanismes naturels de défense face aux stress abiotiques.



Amélioration de
l'efficacité de l'engrais



Engrais
foliaire



Utilisable en
Agriculture Biologique

Produit utilisable en agriculture biologique, conformément au Règlement d'Exécution (UE) n°2021/1165 (Annexes du Règlement (UE) n°2018/848)



Haifa France – 1 127 avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com

Préconisation d'application :

Foliaire : 0,2 – 0,6 kg/ha tous les 10-14 jours

Nutrigation™ : 1 – 1,5 kg/ha tous les 10-14 jours

Hydroponie : 1-3 ppm de silice (SiO₂) tous les 3-4 arrosages

Céréales (2-4 applications) : appliquer pendant le tallage, l'allongement de la tige et du début grain laiteux à maturité des grains.

Légumes-feuilles et choux (4-5 applications) : appliquer à partir de 5-6 vraies feuilles étalées et pendant le développement des feuilles. Choux-fleur : appliquer dès le début du développement de la pomme. Artichaut : faire la première application dès le début du développement des capitules. Choux : appliquer quand le chou atteint 50 % de la taille finale.

Tomate, poivron, concombre, aubergine, melon, pastèque, etc... (4-5 applications) : appliquer à partir du développement des feuilles de l'axe principal jusqu'à développement du fruit.

Agrumes, olives et fruits tropicaux (4-6 applications) : de la croissance végétative jusqu'à maturation du fruit.

Fruits à noyau et fruits à pépins (4-6 applications) : appliquer pendant le stade bourgeon vert, le stade bourgeon blanc, après la floraison, pendant le développement des fruits et début maturation des fruits.

Fruits à baies (4-6 applications) : appliquer au stade 4-6 feuilles déployées, début floraison, chute des pétales, nouaison, développement des fruits, début maturation des fruits.

Vignes et raisins de table (4-6 applications) : appliquer au stade 4-6 feuilles déployées, allongement de l'inflorescence, début floraison, chute des pétales, nouaison, fermeture de grappe, avant véraison.

Gazons de graminées (4-6 applications) : en période de croissance à raison d'une application toutes les 4 à 6 semaines.

Mise à jour : novembre 2023



Haifa France – 1 127 avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)

E-mail: info@haifa-group.com

www.haifa-group.com