

HaifaStim™ Vital

Poudre soluble dans l'eau d'extraits d'algues micronisées

Composition

Matière sèche	95%
Matière organique totale	50%
Oxyde de potassium (K ₂ O)	16,6%
Azote (N) organique	1%
Acide alginique	10%
Mannitol	4%
Bétaïne	0,05%
Acides aminés	4%



Contient des composés physiologiquement actifs qui permettent d'obtenir un rendement plus élevé et une amélioration de la qualité

Conditionnement

- Seau plastique 1 kg – carton de 6 seaux – palette de 66 cartons (396 kg)

Stockage et manutention

- Stocker dans un endroit sec et bien ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil
- Température de stockage conseillée : 5°C - 30°C

Utilisation

Pour nutrigation™ et applications foliaires. Les composés physiologiquement actifs aident à obtenir un rendement maximal en terme qualitatif et quantitatif. Améliore le fonctionnement et la performance de la plante entière.



Amélioration de
l'efficacité de l'engrais



Engrais
foliaire



Utilisable en
Agriculture Biologique

Produit utilisable en agriculture biologique, conformément au Règlement d'Exécution (UE) n°2021/1165 (Annexes du Règlement (UE) n°2018/848) – AMM n° 1230398



Haifa France – 1 127, avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com

Préconisations d'utilisation

- Nutrigation™ : 2-3 kg/ha toutes les 3-4 semaines, concentration de 0,03 à 0,05 % dans l'eau d'irrigation.
- Application foliaire : 1-2 kg/ha, volume de bouillie 600 à 1 000 L.

Cultures	Dose maximale d'apport (kg/ha)	Nombre maximum d'apports par an	Application	Epoque d'apport / stades d'application
Agrumes	3	4	Ferti-irrigation	Début débourrement, préfloraison, nouaison, et grossissement des fruits
	2		Pulvérisation foliaire	
Arbres fruitiers (fruits à pépins et à noyaux)	3	3	Ferti-irrigation	Emergence du bourgeon, préfloraison, et grossissement des fruits
	2		Pulvérisation foliaire	
Vigne	3	3	Ferti-irrigation	Début débourrement, nouaison, et grossissement des baies
	2		Pulvérisation foliaire	
Cultures florales (rose, géranium ...)	3	4	Ferti-irrigation	Tous les 14-21 jours après transplantation/fin dormance
	2		Pulvérisation foliaire	
Cultures légumières (solanacées et cucurbitacées)	3	4	Ferti-irrigation	Tous les 14 jours pendant la saison à partir du démarrage végétatif
	2		Pulvérisation foliaire	
Cultures légumières (laitue, chicorée, bette à carde)	3	4	Ferti-irrigation	Cultures légumières (laitue, chicorée, bette à carde)
	2		Pulvérisation foliaire	

Conditions d'emploi

- Port de gants et de vêtements de protection adaptés ainsi que d'EPI appropriés en fonction du type et du classement de la préparation.
 - Ne pas appliquer le produit après la formation des parties consommables et ne pas appliquer le produit sur les cultures dont les parties consommables peuvent entrer en contact avec le sol.
-

Mise à jour : novembre 2023



Haifa France – 1 127, avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com