



final eko

Potasse foliaire pour l'agriculture biologique



DESCRIPTION

Final eko est un produit solide concentré à base de Potassium (K), de Bore (B) et de Zinc (Zn) pour la nutrition des cultures. **Final eko** est un produit formulé dont les composantes sont 100% solubles dans l'eau. Issu de la technologie Tradecorp, Le Zinc (Zn) est chélaté par EDTA.

AVANTAGES

Le Potassium (K) favorise le rendement des cultures grâce à l'amélioration de la vitesse de croissance et du développement du calibre. Il améliore également la qualité de la récolte: concentration en sucres (^obrix), la coloration (anthocyanes et carotènes), la qualité de peau (parois cellulaires) et une meilleure accumulation de sucres (amidon). Le Potassium est un élément essentiel à la lutte contre les stress climatiques par son rôle dans la régulation stomatique.

Associé au Bore (B) et au Zinc (Zn), le Potassium de **Final eko** stimule fortement la mise en réserve des plantes pérennes après la récolte conférant ainsi à la plante une meilleure résistance aux conditions hivernales et un démarrage plus vigoureux au printemps.

COMPOSITION

Potassium (K ₂ O), soluble eau	47 %
Bore (B) soluble eau	1 %
Zinc (Zn) soluble eau et chélaté par EDTA	0,5 %

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Poudre
Couleur :	Blanche
Densité :	1,5
pH (solution 1%) :	6,2
Solubilité:	100 g/L

ENGRAIS CE





final eko



APPLICATION FOLIAIRE

Céréales	1-2 x 2 kg/ha	entre fin épiaison et fin floraison.
Maïs	3-5 kg/ha	entre 6-12 feuilles.
Colza	3 - 5 kg/ha 3-5 kg/ha	en automne pour favoriser la mise en réserve. entre pleine floraison et fin floraison.
Betterave	1-2 x 5 kg/ha	à partir du stade 10-15 feuilles.
Pois-haricot-soja	3-5 kg/ha	entre chute des pétales et grossissement des gousses.
Pomme de terre	4 x 5 kg/ha	après fermeture des lignes et pendant le grossissement.
Poireau	5 x 3-5 kg/ha	pendant toute la période de grossissement. Augmenter le nombre de passage en production automnale et hivernale si le lessivage est important.
Fraise	4-5 x 2-3 kg/ha	premier traitement avant la première floraison et puis pendant le grossissement des fruits.
Carotte - Céleri	5 x 3 kg/ha	à partir du stade 10 feuilles et pendant le grossissement.
Chou - Chou-fleur	3 x 4-5 kg/ha	au stade 6 feuilles et pendant le grossissement.
Concombre Courge	1 x 2 kg/ha 3-5 x 2 kg/ha	avant la première floraison. pendant la période de grossissement.
Tomate - Poivron Aubergine	1 x 2 kg/ha 3-5 x 2 kg/ha	avant la première floraison pendant la période de grossissement.
Epinard	3 x 2-3 kg/ha 4-5 x 2-3 kg/ha	tous les 10 jours dès la fermeture des lignes. en production de jours courts. Terminer 15 jours avant récolte.
Melon	2 x 3 kg/ha	au stade 6 feuilles et au début du grossissement du fruit.
Fruits à pépins	4 x 2,5-3 kg/ha	de début nouaison à 3-4 semaines avant récolte.
Fruits à noyau	4 x 2,5-3 kg/ha	de début nouaison à 3-4 semaines avant récolte.
Cerise	2 x 3 kg/ha	début nouaison et 10-15 jours plus tard.
Vigne	3 x 2-3 kg/ha	entre le stade fermeture de la grappe et mi-véraison.
Mise en réserve cultures pérennes	4-5 kg/ha	entre récolte et chute des feuilles.

PRECONISATIONS

Volume d'eau minimum de 150 L par hectare.

COMPATIBILITE

Compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires couramment utilisés. En cas de mélange, faire un test préalable. Ne pas mélanger plus de deux produits. Pour une efficacité maximale, traiter sur feuille sèche. Prévoir 3 à 4 heures sans pluie après le traitement pour assurer une pénétration optimale. Dissoudre **Final eko** en premier dans la cuve.