


Agro'CIMS Easy

45% Moutarde d'Abyssinie UNDERCOVER + 35% Trèfle d'Alexandrie AKENATON / LUIS
+ 20% Phacélie STALA

Caractéristiques techniques :



* SIE=Surface d'intérêt écologique




Type de semis	Potentiel de production de biomasse
Précoce (avant le 30 juillet)	++
Intermédiaire (1er au 31 août)	++
Tardif (après le 1er septembre)	=/ --

Composition du mélange :

■ Trèfle d'Alexandrie AKENATON/LUIS 35%

■ Phacélie STALA 20%

■ Moutarde D'Abyssinie UNDERCOVER 45%



Nombre de graines / m²
pour un semis à 6 kg / ha

Implantation :

Dose de semis :

Couvert d'Intercultures Multi Services: 6Kg/ha

Période de semis : préconisation technique

Couvert d'Intercultures Multi Services: du 15 Juillet au 15 Septembre.

Adapter cette préconisation selon les arrêtés préfectoraux départementaux en vigueur dans le cadre des SIE.

Conditions de semis :

Réaliser un déchaumage et un travail du sol pour obtenir un lit de semences permettant d'optimiser la levée.

Privilégier un semis en ligne à une profondeur de 1 cm suivi d'un roulage.

Labourer si usage de sulfonylurées sur culture précédente.

Penser à bien mélanger les semences pour éviter les semis hétérogènes.



Adaptation à la rotation :

Culture de la rotation	
Colza	--
Tournesol	++
Pois	+/-
Féverole	++
Lin	++

Points forts

- Faible dose de semis, facile à semer
- Très bonne biomasse
- Très bonne couverture du sol

Adaptation à la culture suivante :

Culture suivant le couvert		Commentaires
Blé assolé ou orge d'hiver	++	
Blé de blé	++	Réduction possible du piétin échaudage d'un blé sur blé derrière un couvert de crucifère
Orge de printemps	++	
Pois, féverole ou soja	--	Risque sclérotinia
Maïs	++	Aucun effet négatif sur maïs des crucifères si le couvert est détruit au minimum 2 mois avant l'implantation du maïs
Sorgho	++	
Tournesol	-	Attention à une bonne gestion du couvert pour éviter toute grenaison de la phacélie: risque désherbage. Risque sclérotinia
Lin	+	

Mode de destruction :

Destruction par le gel (minimum de -8°C à -10°C sur plusieurs nuits successives pour destruction efficace) si développement suffisant des végétaux.

Efficacité de la destruction améliorée par le roulage en temps de gel.

Un broyage suivi d'un labour s'avère aussi très efficace.

++	Très bien adapté
+	Bien adapté
+/-	Assez adapté
-	Peu adapté
--	Très peu adapté