

COMPOSITION PRAIRIALE
Durée d'exploitation : 5 ans



FOURRAGÈRES LG
CULTIVER LA QUALITÉ



LG PÂTURE ABONDANCE

Pour les hautes performances



Utilisation



- Des RGA haut de gamme
- Haute valeur alimentaire
- Facile d'exploitation
- État sanitaire irréprochable



Retrouvez plus d'informations
sur **LGseeds.fr**





COMPOSITION PRAIRIALE
Durée d'exploitation : 5 ans



LG PÂTURE ABONDANCE

Pour les hautes performances

FOURRAGÈRES LG
CULTIVER LA QUALITÉ

Utilisation



PÂTURAGE



AFFOURAGEMENT



ENSILAGE



ENRUBANNAGE



FOIN

● Peu adapté

● Moyennement adapté

● Très adapté


Composition

Des variétés spécialement sélectionnées pour améliorer la qualité de la ration :


- Épiaisons tardives des graminées pour faciliter l'exploitation au premier cycle.
- Un trèfle blanc agressif pour améliorer la teneur en protéines et l'appétence.

Espèce	Variété	Type variétal	Points forts
Ray-grass anglais	GOYAVE	Très tardif diploïde	Le RGA très tardif 2n le plus productif, faible remontaison, tolérance maladies, vigueur à la levée
Ray-grass anglais	BYZAN	Tardif tétraploïde	1 ^{ère} variété en production été/automne, pérennité 1 ^{ère} variété, excellente tolérance à la rouille
Ray-grass anglais	HOPI	Tardif tétraploïde	Rendement exceptionnel, une des meilleures tolérances à la rouille, faible remontaison
Fétuque des prés	PETRARCA		Haute productivité de printemps, adaptation à la fauche, facilité de séchage
Trèfle blanc	BRIANNA	Géant	Agressivité, productivité, forte présence de stolons, faible floraison, pérennité


Composition du mélange




Peuplement dans la prairie



Valeurs alimentaires



Côté ration : couverture des besoins



AJR : Apports Journaliers Recommandés
Distribué à 7 kg MS d'ensilage pour une VL de 650 kg produisant 35 kg de lait/j.

Les points forts

- Composition pâturage longue durée, pleinement adaptée aux sols sains et/ou humides
- Fourrage très appétent et équilibré (UF/PDI)
- Adaptée pour une valorisation en ensilage
- Variétés tolérantes à la rouille

Nos conseils

- Apporter 30 à 40 unités d'azote à 200 °C jour pour dynamiser le démarrage en végétation
- Un déprimage sortie hiver permet de favoriser le tallage et le démarrage du trèfle blanc
- Revenir au maximum à 4 semaines au pâturage pour préserver la qualité
- Faucher entre 6 et 8 cm
- Nettoyer la parcelle avant l'hiver par un pâturage

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.