

Fiche d'identité

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AMM                          | N° 2110063                                                                             |
| Composition et mode d'action | Clopyralid 720 g/kg<br>HRAC 4 (O)                                                      |
| Formulation                  | Granulé Soluble (SG)                                                                   |
| Classement                   |  H410 |
| ZNT                          | 5 mètres                                                                               |
| DAR <sup>(1)</sup>           | Voir tableau des usages                                                                |
| DRE <sup>(2)</sup>           | 6 heures                                                                               |

<sup>(1)</sup> DAR = Délai avant récolte. <sup>(2)</sup> DRE = Délai de Rentrée

Utilisations

| Cultures                                                | Stades d'application                                                                                             | Dose                                                                                                                    | Cible                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colza d'hiver et printemps, Moutarde, Navette, Cameline | Du stade début élongation (BBCH30) au stade boutons floraux visibles (BBCH51)<br>À partir du 15 février          | 174 g/ha <sup>(1)</sup>                                                                                                 | Lutte contre dicotylédones annuelles et vivaces <sup>(3)</sup>                                  |
| Betteraves industrielle, fourragère et potagère         | Du stade cotylédons (BBCH10) à la fermeture du rang (BBCH39)<br>À partir du 1 <sup>er</sup> avril                | 40 à 60 g/ha <sup>(2)</sup> en fractionné dans le cadre d'un programme                                                  | Mise en programme pour lutter contre les dicotylédones annuelles                                |
|                                                         |                                                                                                                  | 174 g/ha <sup>(1)</sup> ou 2 x 85 g/ha <sup>(2)</sup>                                                                   | Lutte contre les vivaces <sup>(3)</sup>                                                         |
| Maïs ensilage, grain, Millet, Moha, Miscanthus          | Du stade 1 feuille (BBCH 11) au stade 10 feuilles (BBCH32)<br>À partir du 1 <sup>er</sup> avril                  | 174 g/ha <sup>(1)</sup> ou 2 x 85 g/ha <sup>(2)</sup><br>DAR 60 jours pour l'ensilage<br>10 feuilles pour le maïs grain | Lutte contre dicotylédones annuelles et vivaces (Chardons, Laiterons, Datura...) <sup>(3)</sup> |
| Sorgho                                                  | Du stade 4 feuilles (BBCH14) au stade 8 feuilles (BBCH18)                                                        | 174 g/ha <sup>(1)</sup><br>DAR 42 jours pour l'ensilage                                                                 |                                                                                                 |
| Lin Oléagineux et textile                               | Du stade début élongation 10 cm (BBCH30) à boutons floraux visibles (BBCH51)<br>À partir du 1 <sup>er</sup> mars | 174 g/ha <sup>(1)</sup>                                                                                                 |                                                                                                 |
| Épinard, Feuilles de bette                              | Du stade 2 feuilles (BBCH12) au stade 6 feuilles (BBCH16)                                                        | 120 g/ha<br>DAR 2 jours                                                                                                 | Lutte contre dicotylédones annuelles et vivaces <sup>(3)</sup>                                  |
| Navet, Rutabaga                                         | Du stade 2 feuilles (BBCH12) au stade rosette taille finale (BBCh39)                                             | 174 g/ha <sup>(1)</sup>                                                                                                 |                                                                                                 |

PPAMC : Pour les utilisations de Lontrel™ SG sur ces cultures, voir les recommandations de l'institut technique ITEIPMAI ou FNAMS.

<sup>(1)</sup> Application unique à dose pleine.  
<sup>(2)</sup> Application fractionnée autorisée, ne pas dépasser la dose totale de 1,25 L/ha par an. Intervall maximal entre 2 applications = 15 jours.  
<sup>(3)</sup> Chardons, laitersons



 Attention. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**Lontrel™ SG** : SG - granulés solubles dans l'eau, contenant 720 Grammes par Kilo de Clopyralid. AMM N° 2110063 - Corteva Agriscience France S.A.S.  
Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, Bâtiment Equinoxe 2 - 1 Bis avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. N° d'agrément 7800030 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.  **N° Vert 0 800 470 810**.  
©TM Marques déposées de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées.  
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des produits et/ou sur [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com).

À VOTRE ÉCOUTE

 0 800 470 810  
[corteva.fr](http://corteva.fr)

Février 2025



Visitez [www.corteva.fr](http://www.corteva.fr)  
\* ® Marques déposées de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées © 2025 Corteva

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



L'anti-chardon multicultures



## Un mode d'action unique

### • Efficacité de Lontrel™ SG

Le Clopyralid est reconnu pour son efficacité dans la lutte contre des vivaces et des dicotylédones difficiles à détruire, en particulier : un grand nombre de composées, ombellifères, polygonacées, légumineuses.

### • Sélectivité de Lontrel™ SG

Lontrel™ SG est sélectif des cultures telles que les betteraves industrielle et potagère, colza, maïs, sorgho, cultures porte-graines mineures, lin textile et oléagineux...

### • Systémie de Lontrel™ SG : détruit les adventices jusqu'aux racines

Le Clopyralid est véhiculé par la sève jusqu'aux racines et/ou rhizomes. Grâce à son excellente systémie, les vivaces ciblées sont détruites en profondeur.

## Positionnement technique

### Non traité



## Les atouts de Lontrel™ SG



### Sélectivité reconnue



### Destruction en profondeur des vivaces (*Rhizomes*)



### Contrôle du chardon et laiteron dans la rotation




### Un atout pour la gestion des matricaires, séneçons

## Le champ d'activité

| Adventices : stade plantule                      | Lontrel™ SG<br>174 g/ha + huile végétale |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>COMPOSÉES</b>                                 |                                          |
| Anthemis                                         | S                                        |
| Matricaire                                       | S                                        |
| Chrysanthème des moissons                        | S                                        |
| Séneçon commun                                   | TS                                       |
| Laiterons                                        | TS                                       |
| Repousses de tournesol                           | TS                                       |
| Lampsrane commune                                | TS                                       |
| Erigeron du Canada                               | S                                        |
| <b>OMBELLIFÈRES</b>                              |                                          |
| Ethuse                                           | MS                                       |
| Ammi Majus                                       | MS                                       |
| Anthriscue commun                                | MS                                       |
| <b>POLYGONACÉES</b>                              |                                          |
| Renouée liseron                                  | MS                                       |
| Renouée des oiseaux                              | MS                                       |
| <b>Vivaces</b>                                   |                                          |
| <b>Lontrel™ SG<br/>174 g/ha + huile végétale</b> |                                          |
| <b>COMPOSÉES</b>                                 |                                          |
| Chardon des champs                               | S                                        |
| Laiteron des champs                              | TS                                       |
| Tussilage pas d'âne                              | S                                        |
| Armoire vulgaire                                 | MS                                       |
| Pissenlit dent de lion                           | S                                        |
| Repousses de chicorées                           | S                                        |
| <b>POLYGONACÉES</b>                              |                                          |
| Rumex                                            | MS                                       |
| Renouée amphibie                                 | MS                                       |
| <b>LÉGUMINEUSES</b>                              |                                          |
| Gesse tubéreuse                                  | TS                                       |
| Trèfle                                           | TS                                       |
| Repousses de luzerne                             | TS                                       |

**TS** Très sensible ≥ 95%    **MS** Moyennement sensible 70-84%    **TPS** Très peu sensible ≤ 49%  
**S** Sensible 85-94%    **PS** Peu sensible 50-69%

### Traitement Lontrel™ SG



## Recommandations d'emploi

- Volume de bouillie minimum de 150 L/ha
- Appliquer par temps poussant = température moyenne supérieure à 12°C avec hygrométrie supérieure à 60%
- Ajouter une huile végétale homologuée pour bouillie herbicide régularise les efficacités
- Intervenir sur des chardons de 10 à 20 cm de hauteur