

TECHNO INTENS

Fiche d'identité

Nom commercial : **TECHNO INTENS**

Composition : **METALDEHYDE 2.5 %**

N° AMM : **2130086**

Type d'action : **DIVERS**

Formulation : **(GB) APPAT GRANULE**

Conditionnement : **15kg**

TECHN'O Intens est une spécialité anti-limaces qui bénéficie de l'effet de choc et des performances du métaldéhyde. Son granulé TECHN'O est synonyme d'une bonne balistique, répartition et couverture du sol. Sa formule Intens renforce l'appétence et l'attractivité de cette spécialité. Les deux combinés en font une spécialité technique haut de gamme. La dose recommandée est de 4kg/ha. elle peut être modulée de 3 à 5 kg en fonction de la pression limaces.



Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Agrumes	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) : - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						
Artichauts	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : En plein sur la parcelle traitée. Dose :						

NC Non Classé

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Autres salades	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): - Culture sous abri ou en plein champ. - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : début de la formation des têtes Dose :						
Avoine	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Céréales à paille (blé, seigle, orge, avoine): - En plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha et/ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha. - Dernière application : début montaison Dose :						
Betterave fourragère	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet: - Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. - Dernière application : 5 feuilles étalées. Dose :						
Betterave industrielle	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet: - Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. - Dernière application : 5 feuilles étalées. Dose :						
Betterave potagère	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet: - Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. - Dernière application : 5 feuilles étalées. Dose :						

NC Non Classé
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Blés	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Céréales à paille (blé, seigle, orge, avoine): - En plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha et/ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha. - Dernière application : début montaison Dose :						
Brocolis	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : En plein sur la parcelle traitée. Dose :						
Cameline	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide): - Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Dose :						
Cassissier	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) : - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						
Chanvre	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide): - Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Dose :						
Choux de bruxelles	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : En plein sur la parcelle traitée. Dose :						

NC Non Classé
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Choux pommés	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : En plein sur la parcelle traitée. Dose :						
Choux-fleurs	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : En plein sur la parcelle traitée. Dose :						
Colza	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide): - Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Dose :						
Cultures florales	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Sous abri ou en plein champ Dose :						
Cultures ornementales	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Sous abri ou en plein champ Dose :						
Epinards	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): - Culture sous abri ou en plein champ. - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : début de la formation des têtes Dose :						

NC Non Classé
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Feuilles de bettes	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): - Culture sous abri ou en plein champ. - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : début de la formation des têtes Dose :						
Féverole	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écoscé, pois non écoscé, petit pois écoscé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin): - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : 5 feuilles étalées Dose :						
Fines herbes	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): - Culture sous abri ou en plein champ. - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : début de la formation des têtes Dose :						
Fraisier	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Culture sous abri ou en plein champ. - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						
Framboisier	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) : - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						

NC Non Classé
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Fruits à coque	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) : - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						
Fruits à noyau	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) : - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						
Fruits à pépins	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) : - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						
Gazon de graminées	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Dose :						
Groseiller	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) : - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						

NC Non Classé
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Haricots frais écosés	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écosé, pois non écosé, petit pois écosé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin): - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : 5 feuilles étalées Dose :						
Haricots secs	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écosé, pois non écosé, petit pois écosé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin): - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : 5 feuilles étalées Dose :						
Haricots verts	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écosé, pois non écosé, petit pois écosé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin): - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : 5 feuilles étalées Dose :						
Laitue	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): - Culture sous abri ou en plein champ. - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : début de la formation des têtes Dose :						
Lentilles fraîches	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écosé, pois non écosé, petit pois écosé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin): - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : 5 feuilles étalées Dose :						

NC Non Classé

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Lentilles sèches	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écosé, pois non écosé, petit pois écosé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin): - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : 5 feuilles étalées Dose :						
Lin	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide): - Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Dose :						
Lupin	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écosé, pois non écosé, petit pois écosé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin): - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : 5 feuilles étalées Dose :						
Mâche	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bête, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): - Culture sous abri ou en plein champ. - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : début de la formation des têtes Dose :						
Maïs	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet: - Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. - Dernière application : 5 feuilles étalées. Dose :						

NC Non Classé
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Maïs doux	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet: - Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. - Dernière application : 5 feuilles étalées. Dose :						
Millet	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet: - Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. - Dernière application : 5 feuilles étalées. Dose :						
Moutarde	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide): - Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Dose :						
Myrtillier	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) : - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						
Navets	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet: - Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. - Dernière application : 5 feuilles étalées. Dose :						

NC Non Classé
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Orges	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Céréales à paille (blé, seigle, orge, avoine): - En plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha et/ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha. - Dernière application : début montaison Dose :						
Petits fruits	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) : - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						
Pois écosés frais	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écosé, pois non écosé, petit pois écosé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin): - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : 5 feuilles étalées Dose :						
Pois non écosés	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écosé, pois non écosé, petit pois écosé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin): - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : 5 feuilles étalées Dose :						
Pois proteagineux	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écosé, pois non écosé, petit pois écosé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin): - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : 5 feuilles étalées Dose :						

NC Non Classé
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Pois sec	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écosé, pois non écosé, petit pois écosé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin): - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : 5 feuilles étalées Dose :						
Pommes de terre	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4	7 jours	5 m
Usage : En plein sur la parcelle traitée. Dose :						
Pourpier	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): - Culture sous abri ou en plein champ. - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : début de la formation des têtes Dose :						
Prairies non permanentes	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4	49 jours	5 m
Usage : En plein sur la parcelle traitée. En mélange avec les semences à la dose de 5 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Dernière application au plus tard 49 jours avant la mise en pâture. Dose :						
Prairies permanentes	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4	49 jours	5 m
Usage : En plein sur la parcelle traitée. En mélange avec les semences à la dose de 5 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Dernière application au plus tard 49 jours avant la mise en pâture. Dose :						

NC Non Classé
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Rutabagas	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet: - Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. - Dernière application : 5 feuilles étalées. Dose :						
Scarole, frisée	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): - Culture sous abri ou en plein champ. - En plein sur la parcelle traitée. - Dernière application : début de la formation des têtes Dose :						
Seigles	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Céréales à paille (blé, seigle, orge, avoine): - En plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha et/ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha. - Dernière application : début montaison Dose :						
Soja	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide): - Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Dose :						
Sorgho	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet: - Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. - Dernière application : 5 feuilles étalées. Dose :						

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Tournesol	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide): - Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Dose :						
Triticale	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Céréales à paille (blé, seigle, orge, avoine): - En plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha et/ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha. - Dernière application : début montaison Dose :						
Vigne - raisin de cuve	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) : - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						
Vigne - raisin de table	Trt Sol	Mollusques escargots, Escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) : - En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. - Dernière application : fin de la floraison Dose :						

Description

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

NC Non Classé
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

TECHNO INTENS

Nom commercial :	TECHNO INTENS
Mention d'avertissement :	-
Mention de danger :	NC Non Classé EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Conseils de prudence :	P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/nationale.
DRE	6h
Détenteur homologation :	DE SANGOSSE
Marque déposée :	PHYTEUROP
Réglementation transport ADR :	Voir FDS

NC Non Classé

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**