

maniflow

Bouillie
bordelaise
liquide

Utilisable **BIO**
en agriculture biologique

RÈGLEMENT CE N°2018/848



SULFATE DE CUIVRE

AMM N° 2090121

124 gCu/L



GAMME

Biocontrôle & Protection



VIGNE



ARBORICULTURE



MARAÎCHAGE



Autorisé en AB et NOP.



Non classé (toxicité).



Formulation liquide
haut de gamme.



Haut niveau
de pureté du cuivre.




Facilité d'emploi.

• QUALITÉ DE FORMULATION

Suspension Concentrée (SC) incluant des co-formulants activateurs d'efficacité.

Qualité et homogénéité de la bouillie




Amélioration de la rétention



Amélioration de l'étalement



Réduction du lessivage



maniflow


BOUILLIE BORDELAISE WG ou WP



• BONNE RÉSISTANCE AU LESSIVAGE

Grâce aux co-formulants et à la **qualité du cuivre**.

PPM d'IONS Cu ++ SUR FEUILLES - 500 g Cu métal/ ha appliqué à chaque modalité



Laboratoire de l'université de Bologne.

CULTURE : Tomate
VARIÉTÉ : Marmande

J1 TRAITEMENT
J2 LESSIVAGE 60mm
J3 QUANTIFICATION

Culture	Cible Usage	Dose maximum d'emploi	Nb Max d'applications par an (Intervalle entre applications)	Stade d'application	DAR ou stade limite de traitement	ZNT (DVP)	Sous abri
Concombre*	Mildiou	6 L / Ha	4 (7 jours)	BBCH 10 - BBCH 89	3 jours	20 m (20 m)	Oui
Laitue*	Mildiou Bactérioses	6 L / Ha	4 (7 jours)	BBCH 12 - BBCH 49	7 jours	20 m (20 m)	Oui
Melon*	Mildiou Bactérioses	6 L / Ha	4 (7 jours)	BBCH 10 - BBCH 89	7 jours	20 m (20 m)	Non
Oignon*	Mildiou Bactérioses	6 L / Ha	4 (7 jours)	BBCH 14 - BBCH 47	3 jours	20 m (20 m)	Non
Tomate fraîche & Aubergine	Mildiou	6 L / Ha	5 (7 jours)	NC	3 jours	5 m	Non
Tomate industrielle	Mildiou	6 L / Ha	5 (7 jours)	NC	10 jours	5 m	Non
Cerisier	Coryneum Polystigma	12 L / Ha	1	BBCH 91 - BBCH 03	BBCH 03	50 m (20 m)	Non
Fruit à coque	Bactérioses	10 L / Ha	1	BBCH 99 - BBCH 11	BBCH 11	50 m (20 m)	Non
Pêcher*	Cloque Coryneum Polystigma	12 L / Ha	1	BBCH 91 - BBCH 03	BBCH 03	50 m (20 m)	Non
Pommier, Poirier, Cognassier, Nashi	Bactérioses Chancres européens Tavelure	12 L / Ha	1	BBCH 91 - BBCH 51	BBCH 51	50 m (20 m)	Non
Prunier*	Bactérioses	3 L / Ha	4 (14 jours)	BBCH 69 - BBCH 85	21 jours	50 m (20 m)	Non
	Coryneum Polystigma	12 L / Ha	1	BBCH 91 - BBCH 03	BBCH 03	50 m (20 m)	Non
Vigne*	Mildiou	6 L / Ha	5 (7 jours)	NC	21 jours	20 m	Non

* Cultures de référence

• FACILITÉ D'UTILISATION

- ✓ AUCUNE FORMATION DE MOUSSE
- ✓ TRÈS BONNE TENUE AU STOCKAGE
- ✓ ABSENCE DE POUSSIÈRE
- ✓ MISE EN SUSPENSION IMMÉDIATE
- ✓ PAS DE BOUCHAGE DE BUSES

CAPACITÉ D'ÉCOULEMENT

> à 90%

DISPERSIBILITÉ & SUSPENSIBILITÉ

> à 99%

maniflow

SUSPENSION CONCENTRÉE

SULFATE DE CUIVRE TRIBASIQUE

SUSPENSION CONCENTRÉE

DOSE Cu	744 g Cu/ha	750 g Cu/ha
VISCOSITÉ	630 cp	980 cp
SUSPENDIBILITÉ	> à 99%	~ 87%

maniflow
PLUS FLUIDE

maniflow
MEILLEURE SUSPENSION

CONDITIONS D'EMPLOI :

Verser la quantité nécessaire de MANIFLOW dans la cuve du pulvérisateur à moitié remplie d'eau, le système d'agitation

fonctionnant. Terminer le remplissage de la cuve sous agitation. L'ajout d'un adjuvant n'est pas utile.

CLASSÉ H410
DRE : 6 HEURES
(8H EN MILIEU FERMÉ)



Homologation et marque déposée par MANICA S.P.A.
Distribué par VIVAGRO

CONDITIONNEMENT :

10
LITRES

+33 (0)5 57 78 32 68
+33 (0)5 57 29 38 35
WWW.VIVAGRO.FR

Vivagro

TECHNOPOLE MONTESQUIEU
5 ALLÉE JACQUES LATRILLE
33650 MARTILLAC