



An Agricultural
Sciences Company

La SOLUTION face aux situations graminées complexes

Fenova Super[®]

Herbicide



Effet booster
anti graminées



Efficacité
FOLLE AVOINE



Solution flexible

Fenova Super®

Herbicide

FENOVA SUPER® HERBICIDE EN RÉSUMÉ

Fenova Super® Herbicide permet de maîtriser en post-levée, les graminées adventices des céréales d'hiver et de printemps, des graminées fourragères et à gazon porte-graines.

Fenova Super® Herbicide est à base de fenoxaprop-p-éthyl, matière active appartenant à la famille des aryloxyphénoxy-propionates souvent appelés « fops » du groupe HRAC 1. Elle agit en inhibant l'enzyme acétyl-coA carboxylase (ACCase) nécessaire à la synthèse des lipides.

N° AMM	2110077
COMPOSITION	69 g/l de fenoxaprop-p-éthyl + 34.5 g/l de cloquintocet-mexyl (Groupe HRAC: Legacy A - New 1)
FORMULATION	Formulation liquide EW (émulsion type aqueux)
CULTURES ET DOSES	Blé tendre d'hiver : 1,2 l/ha Blé dur d'hiver : 1,2 l/ha Triticale : 1,2 l/ha Seigle : 1,2 l/ha Orge d'hiver : 1 l/ha Orge de printemps : 1 l/ha Blé tendre de printemps : 1 l/ha Blé dur de printemps : 1 l/ha Epeautre : 1 l/ha Porte graines : 1 l/ha (<i>Fétuque élevée, Fétuque des prés, Ray-Grass, Brome</i>)
STADE	BBCH11 (1 feuille) à BBCH32 (2 nœuds) - Porte graines : BBCH13 à BBCH 32*
CLASSEMENT	H315 – H317 – H411
DRE	48 heures
CONDITIONS UTILISATION	Ne pas utiliser Fenova Super® Herbicide en présence avérée ou suspicion de résistance aux inhibiteurs de l'ACCase
ZNT	5 m
NBRE D'APPLI / CULTURE	1

*Avant toute utilisation, se référer aux recommandations techniques de la FNAMS.

SPECTRE D'EFFICACITÉ

		GRAMINÉES							DICOTYLÉDONES																					
		Agrostis jouet du vent	PâturinS	Phalaris	Folle Avoine (levée automne)	Ray-grass	Vulpie	Vulpin des champs	Alchémille	Bleuet des champs	Capselle	Fumeterre officinale	Gaillet	Géraniums	Jonc des crapauds	Laiteron maraîcher	Lamier pourpre	Lampsane commune	Matricaire	Mouron rouge	Moutarde des champs	Myosotis des champs	Pensée des champs	Séneçon	Sanve	Stellaire intermédiaire	Tabouret des champs	Véronique agreste	Véronique de Perse	Véronique à feuilles de lierre
> 95%	Très sensible																													
85 à 95%	Sensible à Très sensible																													
70 à 85%	Moyennement sensible																													
< 70%	Peu sensible																													
Fenova Super• 0,8 + H 1 l (1)																														
Pré-levée Battle• Delta 0,6 l																														
Post-levée Battle• Delta 0,6 l + Fenova Super• 0,8 + H 1 l (1)																														
Pré-levée Battle• Delta 0,6 l puis référence D 3 l + Fenova Super• 0.8 + H 1 l (1)																														

(1) Pas d'adjuvantation sur orge d'hiver en association avec d'autres partenaires



Agrostis jouet du vent
Apera spica-venti



Phalaris
Phalaris paradoxa




Folle Avoine
Avena sp.



Vulpin
Alopecurus myosuroides

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION

Fenova Super® Herbicide s'utilise à partir de 1 feuille (BBCH11) jusqu'à 2 nœuds (BBCH32) de la culture et obligatoirement en post-levée des adventices. Pour une meilleure efficacité, il est recommandé d'intervenir sur des adventices à un stade jeune.



Fenova Super® Herbicide peut être associé avec de nombreux antigraminées racinaires et foliaires ainsi qu'avec de nombreux antidi cotylédones.

Afin de prévenir les phénomènes de résistances, intégrer **Fenova Super®** Herbicide dans des programmes de désherbage associant différents modes d'action sur les graminées ciblées.

(1) Pas d'adjuvantation sur orge d'hiver en association avec d'autres partenaires

Il est recommandé de ne pas utiliser **Fenova Super®** Herbicide si l'on suspecte la présence d'une population de graminées adventices résistantes aux inhibiteurs de l'ACCase.

Pour les utilisations sur porte-graines graminées fourragères et à gazons, se reporter aux recommandations techniques de la FNAMS.

CONDITIONS D'APPLICATION

Il est recommandé d'utiliser **Fenova Super®** Herbicide avec un adjuvant de type huile végétale.

Afin d'optimiser l'efficacité de **Fenova Super®** Herbicide, il est préférable de traiter par temps poussant avec une hygrométrie supérieure à 60% et une température supérieure à 8°C.

Éviter de traiter en cas de fortes amplitudes thermiques ou si les températures sont inférieures à 8°C pendant une durée supérieure à 72 heures.

Sur orge d'hiver, une décoloration passagère et un léger tassement peuvent être observés mais ces symptômes sont transitoires, disparaissent rapidement et n'ont aucune conséquence sur le rendement.



CULTURES SUIVANTES

Après une application de **Fenova Super®** Herbicide, toutes les cultures peuvent être implantées dans le cadre de la rotation des cultures sur la parcelle.

Fenova Super®

Herbicide



An Agricultural
Sciences Company



UN DÉSHÉBAGE FACILITÉ

En maîtrisant un spectre large de graminées **Fenova Super®** Herbicide régularise et renforce l'efficacité graminées en programme et associations.

Fenova Super® Herbicide apporte un effet booster anti-graminées aux programmes existants et une efficacité qui fait référence en folle avoine.



UNE SOLUTION FLEXIBLE

Fenova Super® Herbicide est utilisable sur de nombreuses cultures céréalières (hors avoine) et peut s'utiliser à l'automne ou en sortie d'hiver.

UTILISATION SÉCURISÉE

La sécurité est une priorité chez FMC et nous encourageons les agriculteurs et les utilisateurs à utiliser nos produits avec attention. Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant

la mise en place de protections individuelles.

- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex. : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex. : procédure d'habillage/déshabillage).
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

LES BONS GESTES POUR TRAITER EN TOUTE SÉCURITÉ



► N'utilisez les produits phytopharmaceutiques que si nécessaire.



► Protégez votre santé et celle de votre entourage.



► Surveillez les conditions météorologiques.



► Protégez les points d'eau.



► Protégez les pollinisateurs.



► Préservez la faune sauvage.



D'INFOS SUR WWW.MON-PHYTO-PRATIQUE.FR : FLASHEZ-MOI

Fenova Super® : Emulsion de type aqueux (EW) contenant 69 g/L fenoxaprop-P-éthyl (6,7% p/p) et 34,5 g/L cloquintocet-mexyl (3,35% p/p). A.M.M. n° 2110077. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d'emploi, restrictions et contre-indications, se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.
® Fenova Super est une marque déposée de FMC Corporation et/ou de l'une de ses filiales. Détenteur de l'homologation (et EMB) : CHEMINOVA A/S - P.O. Box 9 - DK-7620 Lemvig, Danemark. Distribué par FMC France - 11 bis, Quai Perrache - F-69002 Lyon - Tél. +33 (0)4.37.23.65.70 - RCS Lyon B 352 320 279 - www.fmcagro.fr. Dangereux. Respecter les conditions d'emploi. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.
Crédits photos : Shutterstock - 03/22

ATTENTION - H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.