

HaifaStim™ Wall-Up



Formulation concentrée qui apporte aux plantes de la silice facilement assimilable sous forme d'acide orthosilicique combinée avec des oligoéléments chélatés soluble eau

Engrais liquide

- Mélange d'oligoéléments avec cuivre (Cu-EDTA), manganèse (Mn-EDTA) et zinc (Zn-EDTA).

Composition produit

Cuivre (Cu) soluble eau.....	0,8 %
Cuivre (Cu) chélaté EDTA.....	0,8 %
Manganèse (Mn) soluble eau.....	0,8 %
Manganèse (Mn) chélaté EDTA.....	0,8 %
Zinc (Zn) soluble eau.....	1,1 %
Zinc (Zn) chélaté EDTA.....	1,1 %

*Les oligoéléments chélatés EDTA sont stables pour $3 < \text{pH} < 9$

Informations complémentaires

Densité (20°C) kg/L.....	1,23
Ec (0,1% solution).....	0,3 mS/cm
pH (0,1% solution).....	4,3
Oxyde de silice (SiO ₂)	8,5 %
Silice (Si) totale	4 %



Une composition optimisée pour améliorer la résistance de la plante aux stress abiotiques, la croissance, la résistance mécanique et ainsi optimiser le rendement.

Conditionnement

- Bouteille 1 L (1,23 kg) – carton de 12 bouteilles – palette de 77 cartons (924 L)
- Bidon de 20 L (24,6 kg) – palette de 40 bidons (800 L)

Stockage et manipulation

- Stocker dans un emplacement sec et bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil
- Température conseillée de stockage : 5°C - 30°C

Utilisation

Nutrigation™, applications foliaires et hydroponie. Améliore le comportement de la plante face aux mauvaises conditions de croissance et renforce les mécanismes naturels de défense face aux stress abiotiques.



Amélioration de
l'efficacité de l'engrais



Engrais
foliaire



Utilisable en
Agriculture Biologique

Produit utilisable en agriculture biologique, conformément au Règlement d'Exécution (UE) n°2021/1165 (Annexes du Règlement (UE) n°2018/848)



Haifa France – 1 127 avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com

Préconisation d'application :

Foliaire : en accompagnement des stades critiques de croissance et de développement, appliquer tous les 10–14 jours. Pour améliorer l'assimilation du phosphore, appliquer **HaifaStim™ Wall-Up** 2–3 fois tous les 5–7 jours.

- Grandes cultures : 2-4 applications, 1 L/ha, volume bouillie conseillée : 200-300 L/ha.
- Vergers : 2-6 applications, 1 L/ha, volume bouillie conseillée : 500-1 000 L/ha.
- Légumes : 2-5 applications, 1 L/ha, volume bouillie conseillée : 400-600 L/ha.

Nutrigation™ : 100-540 ml/1 000 L de solution fille, tous les 3 à 5 arrosages.

Hydroponie : 100 ml/100 L, 3-6 applications durant la saison de croissance.

Céréales : 2-4 applications ; tallage, élongation de la tige, épiaison – jusqu'au stade laiteux des grains.

Riz : 3-4 applications ; tallage, début élongation tige, fin de l'élongation, début de l'émergence des panicules.

Maïs : 2-4 applications ; 2-6 feuilles, 7-8 feuilles, élongation de la tige, jusqu'au début de la formation de la panicule, de l'émergence de la panicule (épi), jusqu'au début de développement du grain.

Pomme de terre : 2-4 applications ; 3- 6 feuilles déployées sur la tige principale, développement des tiges latérales jusqu'à la couverture totale du sol, initiation des tubercules jusqu'à 10 % de la taille de récolte, tubercules à 80-90 % du poids de récolte.

Agrume : 4-5 applications ; plus de 5 feuilles visibles pas à pleine taille, pousses à environ 20 % de la taille définitive, fleurs visibles mais encore fermées (stade bouton vert) – du stade bouton blanc jusqu'au début de développement du fruit- jusqu'à la chute physiologique des fruits, début de coloration des fruits – Jusqu'à la cueillette.

Fruits à noyau : 4-5 applications ; stade bouton vert, stade bouton blanc, défloraison, majorité des pétales tombés jusqu'à fin de floraison, fruit à 60-70 % de la taille de récolte, début de la récolte.

Autres solanacées : 4-5 applications ; développement des feuilles sur la tige principale, 1-3 inflorescence visibles, début de floraison, premier fruit à taille de récolte sur la première grappe, développement des fruits sur les autres grappes.

Brassicacées : 4-5 applications ; 5- 6 vraies feuilles, développement des feuilles, début du développement de la tête (choux fleur ou pommé) – la tête atteint 60-80 % de la taille de cueillette.

Mise à jour : novembre 2023



Haifa France – 1 127 avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com