



folur®

Solution uréique à très faible teneur en Biuret



DESCRIPTION

Folur est un produit liquide à base d'azote uréique spécialement conçu pour un apport d'azote à action rapide par voie foliaire.

AVANTAGES

Sa très faible teneur en biuret, unique sur le marché, et son pH confère à **Folur** une très grande sécurité et souplesse d'utilisation. L'originalité de **Folur** est la présence d'un indicateur de pH vous assurant une pulvérisation en absence d'ammoniaque et à un pH optimisant l'efficacité du traitement.

En encadrement de véraison, l'application foliaire de **Folur** améliore la teneur en acides aminés des moûts, assurant ainsi une fermentation complète gage d'un vin de qualité.

COMPOSITION

Azote total (N) sous forme uréique	222 g/l	(20 % p/p)
Biuret	< 0,55 g/l	(0,05% p/p)

Absence d'azote nitrique et d'ammoniaque libre

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|-----------|---------|
| ▪ Aspect | Liquide |
| ▪ Couleur | Jaune |
| ▪ pH | 4,4 |
| ▪ Densité | 1,1 |

▪ **ENGRAIS CE**



APPLICATION FOLIAIRE

PRECONISATIONS

Betterave-chicorée	2x10L/ha	au stade 6 feuilles et avant la fermeture des lignes.
Céréales	10L/ha	au stade fin épiaison-début chutes étamines.
Maïs	10L/ha	au stade 4-6 feuilles.
Pommes de terre	2x20L/ha 20L/ha	au stade bouquet 15 cm, 15 jours plus tard. Par application si stress azoté.
Poireau	3 x 10 L/ha	pendant la phase de grossissement du fut. Arrêter 3 semaines avant récolte.
Céleri	3-4 x 10-15 L/ha	commencer 10 jours après repiquage jusqu'à 3 semaines avant récolte.
Chou	2 x 20 L/ha	début pommaison et 15 jours plus tard.
Salade-Laitue	10-15 L/ha	dès la reprise après repiquage. Répéter si besoin.
Epinard	2 x 20L/ha	dès feuillage suffisant à intervalle de 15 jours. Arrêter 10 jours avant la récolte.
Pois-Haricot	2 x 20 L/ha	en encadrement de floraison. Répéter si besoin.
Carotte	15 - 20L/ha	dès feuillage suffisant.
Oignon-Ail-Echalote	10 L/ha 10L/ha	au stade 8 feuille. au stade plein feuillage.
Tomate-Poivron-Aubergine	2 x 10 L/ha 3 x 15 L/ha	entre les stades 6 feuilles et floraison. de la première mise à fruit à 1 mois avant la récolte.
Plantes ornementales	20 L/ha	dès feuillage suffisant.
Pomme-Poire	2 x 10 L/ha 2 (pomme)-4 (poire) x 2-3 L/ha/application pendant grossissement. 20 L/ha	au stade boutons verts et boutons roses/blancs. en post-récolte.
Pêche-Abricot-Nectarine	2 x 5-10 L/ha 10-20 L/ha	début nouaison et 3 semaines plus tard 4 à 6 semaines avant la récolte. 10-20 L/ha en post-récolte
Agrume-Olive	2 x 15-20 L/ha	avant la floraison et 30 jours plus tard. Répéter si forte carence
Fraise	4 x 10 L/ha	à l'apparition des plantes filles, boutons, chute des pétales et fruit blanc.
Vigne	3-4 x 20-25 L/ha	du stade fermeture de grappe à fin véraison. Faire 1 à 2 traitements supplémentaires en cas de stress hydro-azoté sévère.

Ne pas traiter en plein soleil, par temps chaud et sec ($T > 27^{\circ}\text{C}$), par vent fort et desséchant, ni sur la rosée. Traiter de préférence en fin de journée, le traitement n'en sera que plus efficace.

Utiliser un volume minimal de 150 à 200 litres d'eau par ha.

COMPATIBILITE

Compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires couramment utilisés. **Folur**, par l'action pénétrante de l'urée, favorise l'absorption des ions métalliques (Cu, Zn et Mn) de 6 à 30 %, qui en excès peuvent être préjudiciables pour la plante. En cas de mélange avec des produits contenant ces oligo-éléments, il convient de réduire la quantité d'un des composants. En cas de mélange, faire un test préalable.

Pour une pulvérisation efficace et sûre, il faut que la bouille de pulvérisation soit jaune. Si la bouille est orange-rouge, rajoutez petit à petit de l'acide tout en agitant. Arrêtez dès que la solution redevient jaune