

HaifaStim™ Vigor



Peptides et acides aminés libres enrichis avec des composés bioactifs pour nutrigration™

Composition

Matière sèche	55 %
Matière organique totale	56 %
Azote (N) total	8,5 %
<i>dont azote (N) organique</i>	8,3 %
Azote (N) ammoniacal	0,2 %
Acides aminés et peptides totaux d'origine animale.....	52 %
Acides aminés libres d'origine animale.....	15 %
pH (solution 10 %)	6,5



Relance et augmente l'activité des microorganismes dans le sol et améliore les fonctions nutritionnelles et physiologiques des racines.

Conditionnement

- Bidon de 25 L (30 kg) – palette de 30 bidons (750 L)

Stockage et conditionnement

- Stocké dans un endroit sec et bien ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil
- Température de stockage conseillée : 5°C - 30°C

Utilisation

Produit destiné à la nutrigration™. Renforce et améliore la résistance de la plante aux stress abiotiques.



Amélioration de
l'efficacité de l'engrais



Utilisable en
Agriculture Biologique

Produit utilisable en agriculture biologique, conformément au Règlement d'Exécution (UE) n°2021/1165 (Annexes du Règlement (UE) n°2018/848) – AMM 1230399

Conformément à l'art. 3 du règlement UE 142/2021 de la Commission, ce produit est exempté des restrictions prévues par le règlement car il a dépassé le point final de la production.



Haifa France – 1 127, avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com

Préconisation d'emploi

Cultures	Dose maximale par apport	Nombre maximal d'apports	Mode d'apport	Epoques d'apport / Stades d'application
Tomates, aubergines, poivrons, concombres, courgettes	50 L/ha	10/an	Ferti-irrigation	Tous les 15 à 20 jours, de la plantation à la récolte.
Légumes-feuilles	50 L/ha	4/an		Tous les 15 jours, pendant les stades de croissance intense.
Choux, choux cabus, choux de Milan, choux fleurs, choux de Bruxelles, fenouil, céleri	50 L/ha	8/an		Tous les 15 jours, de la plantation à la récolte.
Melons et pastèques	50 L/ha	5/an		Tous les 15 jours, de la plantation à la récolte.
Gerberas, chrysanthèmes, œillets, asperges	50 L/ha	5/an		Tous les 15 jours, après la plantation et pendant la croissance.
Rosiers	50 L/ha	6/an		Tous les 15 jours, après la taille et pendant la récolte.
Cultures ornementales en pépinières	50 L/ha	6/an		Tous les 15 jours, pendant les premiers stades végétatifs et aux périodes de forte croissance.
Arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pêchers, kiwis, agrumes, vigne)	50 L/ha	8/an		Tous les 15 à 20 jours, avant la floraison et de la nouaison au grossissement des fruits.
Fraisiers	50 L/ha	5/an		Tous les 20 jours, de la reprise végétative à la fin de la récolte.
Artichauts	50 L/ha	6/an		Tous les 15 jours, pendant la croissance des capitules.

- Cultures en extérieur : 30-50 L/ha/application tous les 7-10 jours
- Cultures sous serre : réduire la dose de 30 % par rapport aux cultures en extérieur
- Sur plantes stressées, appliquer la dose maximale préconisée

Mise à jour : novembre 2023



Haifa France – 1 127, avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
 E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com