

# CYPLAN® MAX

INSECTICIDE MULTICULTURES



**I N S E C T I C I D E**


**UNE CONCENTRATION  
UNIQUE POUR UN MAX  
D'EFFICACITÉ**

- Insecticide polyvalent et multiculture
- La cyperméthrine la plus concentrée du marché
- Un double mode d'action : contact et ingestion
- Effet choc et persistance

**UPL France** - Tour Voltaire - 2ème étage - 1 place des Degrés - 92800 PUTEAUX  
Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : [contact.uplfrance@upl-ltd.com](mailto:contact.uplfrance@upl-ltd.com) - [fr.uplonline.com](http://fr.uplonline.com)

En savoir plus sur :

**[www.upl-ltd.com/fr](http://www.upl-ltd.com/fr)**



## UNE FORMULATION HAUT DE GAMME

PROPRIÉTÉS  
LIPOPHILES

MEILLEURE  
ADHÉRENCE

RÉSISTE PLUS  
AU LESSIVAGE

MEILLEURE  
PERSISTANCE  
D'ACTION

EFFICACITÉ  
OPTIMALE

### PRÉSENTATION

- Action par contact et ingestion
- Usages multicultures
- Large spectre d'efficacité
- Action choc
- Effet répulsif
- Formulation optimisée

### USAGES ET DOSES

| USAGE HOMOLOGUÉ<br>SUR CULTURE DE RÉFÉRENCE                                               | CULTURES RATTACHÉES<br>ET AUTORISÉES                                                        | CIBLES                                                                                                                                                     | DOSES<br>AUTORISÉES | NOMBRE MAXIMUM<br>D'APPLICATION PAR AN | DAR<br>(JOURS)   | ZNT AQUATIQUE<br>(M) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Céréales à paille :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Pucerons</b>                              | Avoine, Blé, épeautre,<br>triticale, orge, seigle                                           | Pucerons du feuillage<br>Pucerons des épis                                                                                                                 | 0,05 L/ha           | 1                                      | 28               | 20                   |
| <b>Céréales à paille :</b><br><b>Trt. Part.Aer.* Chenilles phytophages</b>                | Avoine, Blé, épeautre,<br>triticale, orge, seigle                                           | Tordeuse des céréales<br>(Cnephasia pumicana)                                                                                                              | 0,05 L/ha           | 1                                      | 28               | 20                   |
| <b>Choux :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages</b>                             | Choux à inflorescences,<br>choux pommés (non au-<br>torisés sur choux feuillus<br>et raves) | Teigne, Piéride, Noctuelles (Mamestra<br>sp., Autographa sp.), Tenthrede                                                                                   | 0,05 L/ha           | 2                                      | 7                | 20                   |
| <b>Crucifères oléagineuses :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages</b>           | Colza, navette, bourrache,<br>sésame, lin oléagineux,<br>lin fibre                          | Tenthrede de la rave, Vanesse du char-<br>bon, Noctuelles (Heliopsis amigera),                                                                             | 0,05 L/ha           | 2                                      | 49               | 20                   |
| <b>Crucifères oléagineuses :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Coléoptères phytophages</b>         | Colza, navette, bourrache,<br>sésame, lin oléagineux,<br>lin fibre                          | Grosse altise (Psylliodes Chrysocephala)<br>Méliphètes des crucifères, Méliphètes<br>du colza,<br>Charançon des tiges,<br>Charançon des siliques           | 0,05 L/ha           | 2                                      | 49               | 20                   |
| <b>Graines protéagineuses :</b><br><b>Trt Part. Aer.* Chenilles phytophages</b>           | Pois protéagineux, pois<br>fourrager, féveroles, lupin                                      | Tordeuse (Cydia nigricana), Noctuelle<br>(Autographa gamma)                                                                                                | 0,05 L/ha           | 2                                      | 14               | 20                   |
| <b>Graines protéagineuses :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Coléoptères phytophages</b>          | Pois protéagineux, pois<br>fourrager, féveroles, lupin                                      | Sitone du pois, Bruche de la fève                                                                                                                          | 0,05 L/ha           | 2                                      | 14               | 20                   |
| <b>Graines protéagineuses :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Pucerons</b>                         | Pois protéagineux, pois<br>fourrager, féveroles, lupin                                      | Pucerons                                                                                                                                                   | 0,05 L/ha           | 2                                      | 14               | 20                   |
| <b>Haricots :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Pucerons</b>                                       | Haricots                                                                                    | Pucerons                                                                                                                                                   | 0,05 L/ha           | 2                                      | 7                | 20                   |
| <b>Lin :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Coléoptères phytophages</b>                             | Lin oléagineux, lin fibre                                                                   | Altises du lin                                                                                                                                             | 0,05 L/ha           | 2                                      | 49               | 20                   |
| <b>Légumineuses potagères (sèches) :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages</b>   | Lentille sèche                                                                              | Tordeuse (Cydia nigricana), Noctuelles,<br>(Mamestra sp., Autographa sp.)                                                                                  | 0,05 L/ha           | 2                                      | 7                | 20                   |
| <b>Légumineuses potagères (sèches) :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Coléoptères phytophages</b> | Lentille sèche                                                                              | Bruches                                                                                                                                                    | 0,05 L/ha           | 2                                      | 7                | 20                   |
| <b>Légumineuses potagères (sèches) :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Pucerons</b>                | Lentille sèche                                                                              | Pucerons                                                                                                                                                   | 0,05 L/ha           | 2                                      | 7                | 20                   |
| <b>Maïs :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages</b>                              | Maïs, millet, moha, mis-<br>canthus, sorgho                                                 | Sésamie                                                                                                                                                    | 0,15 L/ha           | 2                                      | DARF<br>(BBCH67) | 50                   |
| <b>Maïs :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Pyrale(s)</b>                                          | Maïs, millet, moha, mis-<br>canthus, sorgho                                                 | Pyrale(s)                                                                                                                                                  | 0,15 L/ha           | 2                                      | DARF<br>(BBCH67) | 50                   |
| <b>Navet :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages</b>                             | Navet, rutabaga<br>(non autorisé sure radis)                                                | Teigne, Piéride, Noctuelles (Mamestra<br>sp., Autographa sp.)n Tenthrede                                                                                   | 0,05 L/ha           | 2                                      | 14               | 20                   |
| <b>Oignon :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages</b>                            | Oignon, ail, échalote                                                                       | Teigne du poireau                                                                                                                                          | 0,05 L/ha           | 2                                      | 7                | 20                   |
| <b>Oignon :</b><br><b>Trt Part. Aer.* Thrips</b>                                          | Oignon, ail, échalote                                                                       | Thrips                                                                                                                                                     | 0,05 L/ha           | 2                                      | 7                | 20                   |
| <b>Pois :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages</b>                              | Pois non écosés frais,<br>pois écosés frais, pois<br>secs                                   | Tordeuse (Cydia nigricana) Noctuelles<br>(Mamestra sp., Autographa sp.)                                                                                    | 0,05 L/ha           | 2                                      | 7                | 20                   |
| <b>Pois :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Coléoptères phytophages</b>                            | Pois non écosés frais,<br>pois écosés frais, pois<br>secs                                   | Sitone du pois, bruche de la fève                                                                                                                          | 0,05 L/ha           | 2                                      | 7                | 20                   |
| <b>Pois :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Pucerons</b>                                           | Pois non écosés frais,<br>pois écosés frais, pois<br>secs                                   | Pucerons                                                                                                                                                   | 0,05 L/ha           | 2                                      | 7                | 20                   |
| <b>Pomme de terre :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Coléoptères phytophages</b>                  | Pomme de terre                                                                              | Doryphore                                                                                                                                                  | 0,06 L/ha           | 2                                      | 7                | 50                   |
| <b>Rosier :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Pucerons</b>                                         | Rosiers                                                                                     | Pucerons (Macrosiphum sp., Aulacorth-<br>um sp., Aphis sp.), Puceron jaune du<br>rosier, Puceron des céréales et du rosier,<br>Puceron des tiges du rosier | 10 ml/hl            | 2                                      | -                | 50                   |
| <b>Tomate :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages</b>                            | Tomate, aubergine                                                                           | Mineuse de la tomate, Pyrale, Noctuelles<br>(Spodoptera sp., Mamestra sp., Chryso-<br>deixis chalcites, Autographa sp.)                                    | 0,1 L/ha            | 2                                      | 3                | 50                   |
| <b>Vigne :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Cicadelles</b>                                        | Vigne de table, vigne<br>de cuve, vignes-mères,<br>pépinières viticoles                     | Cicadelle des grillures, cicadelle de la<br>flavescence dorée                                                                                              | 0,06 L/ha           | 1                                      | 21               | 50                   |
| <b>Vigne :</b><br><b>Trt Part.Aer.* Tordeuse de la grappe</b>                             | Vigne de table, vigne<br>de cuve, vignes-mères,<br>pépinières viticoles                     | Coccyllis, Eudenis et Eulia                                                                                                                                | 0,06 L/ha           | 1                                      | 21               | 50                   |

# BLÉ



## POSITIONNEMENT

**CYPLAN®MAX** est utilisable à l'automne sur les pucerons du feuillage vecteurs de la JNO (Jaunisse Nanisante de l'Orge) ou à l'répaison sur les différentes espèces qui peuvent provoquer une perte importante du rendement.

# COLZA



## POSITIONNEMENT

Les décisions d'intervention sont combinées entre la présence d'individus, les prises faites au niveau des cuvettes jaunes, de l'observation régulière des champs et du bulletin de santé du végétal (BSV).

**A l'automne : Grosses altises : dès la levée jusqu'au stade 3 feuilles.**

**Au printemps : Charançons de la tige : dès la reprise de végétation jusqu'au stade boutons séparés.**

Afin de préserver ou de gérer la résistance sectorielle de populations d'altises ou de CBT (Charançons du Bourgeon Terminal), il est recommandé de respecter les seuils d'intervention basés sur l'observation communiquée dans les BSV.

# VIGNE



## POSITIONNEMENT

**CICADELLE : CYPLAN®MAX** se positionne de mi-juin à début août pour lutter contre la cicadelle de la flavescence dorée, responsable de la transmission du phytoplasme. La lutte est obligatoire : se référer aux arrêtés préfectoraux en vigueur dans votre département (évaluation du risque sanitaire diffusé par les SRAL et DRAAF). Les populations de cicadelle verte, régulées par les traitements contre les tordeuses avec des produits mixtes tordeuses / cicadelles peuvent nécessiter une application spécifique en cas de forte infestation.


**VERS DE LA GRAPPE (COCHYLIS, EUDEMIS ET EULIA) :** Appliquer préférentiellement **CYPLAN®MAX** en préventif au stade tête noire sur les différentes générations des tordeuses, voire sur de toutes jeunes larves. L'objectif est d'éviter la perforation des baies pour maintenir la qualité de la vendange.

# CYPLAN® MAX

**CYPLAN®MAX** est un insecticide agissant «par contact et ingestion» sur le système nerveux de l'insecte. Sa formulation EC en 500 g/L lui confère un haut niveau d'efficacité sur un large spectre de cultures et d'insectes.

## PRÉSENTATION

- AMM : n° 2100026
- Composition : 500 g/L cyperméthrine
- Famille chimique : Pyréthrinoides
- Formulation : concentré émulsionnable
- Groupe IRAC : 3A
- Mode d'action : contact et ingestion
- DRE : 24h.



## MODE D'ACTION

La cyperméthrine est basée sur la structure du pyrethrum, un insecticide naturel qui est contenu dans les fleurs de chrysanthèmes.

Néanmoins son activité biologique est plus grande et plus stable que son modèle naturel.

La cyperméthrine est un insecticide non systémique qui agit par contact et ingestion.



UPL France est titulaire de l'agrément phytosanitaire N°9200008 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Homologation : N°2100026. Détenteur d'AMM : UPL Europe Ltd - Composition : 500 g/L cyperméthrine - Formulation : concentrée émulsionnable. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>

### DANGER

H226 : Liquides et vapeurs inflammables

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H315 : Provoque une irritation cutanée

H318 : Provoque des lésions oculaires graves

H332 : Nocif par inhalation

H335 : Peut irriter les voies respiratoires

H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges

H373 : risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**