

HaifaStim™ Calmaster Plus



Un calcium complexé sur une base biodégradable, associé avec de l'acide orthosilicique et du fer chélaté

Composition produit (standard)

Oxyde de calcium (CaO) soluble eau.....	9,0 %
CaO complexé par l'acide L-aspartique.....	9,0 %
Fer (Fe)	0,4 %
Fer (Fe) chélaté avec l'EDTA.....	0,21 %
Fe (Fe) chélaté avec le DTPA	0,21 %
Fe (Fe) chélaté avec l'HEEDTA	0,07 %
Fe (Fe) sous forme sulfate	0,09 %



Informations complémentaires

Dioxyde de silice (SiO ₂)	4,3 %
Silice (Si)	2,0 %
pH (0,1 % dans l'eau distillée à 20°C).....	8 ± 1
Ec (0,1 % dans l'eau distillée à 20°C).....	1,5 ± 0,04 mS/cm
Solubilité (*) (eau distillée à 20°C)	700 g/l
Densité	0,75-0,8 g/cm ³
Plage de stabilité : 4 < pH < 7	

Engrais composé de calcium (Ca) complexé par un acide aminé (acide L-aspartique) avec un complément en silice sous forme d'acide orthosilicique et de fer chélaté

Conditionnement

- Sac papier 1 kg – seaux plastiques 2 kg, 5 kg et 20 kg

Stockage et manipulation

- Stocker dans un endroit sec, bien aéré et à l'abri de la lumière directe du soleil
- Bien refermer les contenants après utilisation
- Température conseillée de stockage : 5°C - 30°C

Utilisation

Renforce les membranes cellulaires avec le calcium (Ca) complexé par la technique la plus efficace et stable. La haute efficacité du calcium est permise par la grande rapidité de son absorption et de son assimilation, sa solubilité élevée et sa stabilité en solution.

(*) : solubilité immédiate (12 à 24 heures après la dissolution, un dépôt peut se former).



Amélioration
de l'efficacité
de l'engrais



Engrais
foliaire



Utilisable en Agriculture
Biologique

Produit utilisable en agriculture biologique, conformément au Règlement d'Exécution (UE) n°2021/1165 (Annexes du Règlement (UE) n°2018/848)



Haifa France – 1 127 avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
Tel: 04 67 83 50 70 – E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com

Préconisation d'utilisation

Nutrigation™ : 2-3 kg/ha toutes les deux semaines

Foliaire : 2 kg/ha ou 200 g/hL tous les 7-15 jours

Application de la nouaison jusqu'à la récolte des fruits (solanacées, cucurbitacées, petits fruits rouges, fruits à noyau et à pépin...)

Application mi-culture jusqu'à la récolte (grillure du melon - nécrose marginale, brûlure... sur légumes feuille)

Mise à jour : novembre 2023



Haifa France – 1 127 avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
Tel: 04 67 83 50 70 – E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com