



RAY-GRASS ANGLAIS 4N

INQUERA UNE ENVIE DE BROUTER



Une belle densité au sol pour une résistance optimale au piétinement

Une productivité homogène sur l'ensemble de l'année

Plus de feuilles, moins d'épi : pour une consommation maximale



**Semences
de France**

semencesdefrance.com



RAY-GRASS ANGLAIS 4N INQUERA



RÉSISTANCE
OPTIMALE AU
PIÉTINEMENT

PRODUCTIVITÉ
HOMOGÈNE SUR
L'ENSEMBLE DE
L'ANNÉE

POUR UNE
CONSOMMATION
MAXIMALE

IDENTIFICATION

PLOÏDIE	tétraploïde
TARDIVITÉ	très tardif
PÉRENNITÉ	5 ans
ÉPIAISON	9 juin
SOUPLESSE	69 jours

INQUERA fournit une prairie très dense avec des avantages supplémentaires comme une très bonne rusticité hivernale et une teneur élevée en sucre pour une meilleure appétence


INQUERA est très riche en feuilles, ses qualités fourragères restent élevées, même en été.

INQUERA de par ses pousses automnales, permet d'étendre la saison de pâturage sur les prairies.

CARACTÈRES AGRONOMIQUES

Souplesse d'exploitation

Durée en jour




Remontaison

De 1 à 9 = très remontante



Résistance aux rouilles

De 1 à 9 = résistant



Sources CTPS

RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE

		INQUERA	TÉMOIN
Pluriannuel	1 ^{ère} coupe (A2+A3)	2,9	3
	Printemps (A2+A3)	8,6	8,8
	Été-Automne (A2+A3)	5,9	5,7

Source: CTPS. Témoin = (Carosse + Escal + Alcazar)/3

DOSES DE SEMIS

30 kg/ha en pur

PÉRIODES DE SEMIS

- > Du 15 mars à fin avril
- > Du 15 août au 15 novembre

ASSOCIATIONS POSSIBLES

INQUERA (25KG) + T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

INQUERA (20KG) + RGA 2N (10KG)

INQUERA (15 À 20KG) + RGA 2N (7 À 10KG) + T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

INQUERA (10KG) + RGA 2N (5KG) + F. DES PRÈS (10KG)
+ T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

RECOMMANDATIONS CULTURALES

Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface

Profondeur de semis optimale : 1 cm - Rouler après semis

Surveiller la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire

Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses de sols



Semences
de France

semencesdefrance.com