

BARDAVOS Moutarde anti-nématodes



- Lutte contre le nématode de la betterave
- Floraison tardive
- Couverture rapide du sol

SOLUTION POUR LUTTER CONTRE LES BIOAGRESSEURS

BARDAVOS

Moutarde anti-nématodes

VARIÉTÉ PURE

SEMIS

8 à 10 kg/ha

PÉRIODE

Mi-août à mi-septembre

PROFONDEUR DE SEMIS

1 à 2 cm



Utilisations

- Couvert interculture courte durée

Caractéristiques

- Lutte contre le nématode de la betterave
- Floraison tardive
- Couverture rapide du sol

Destruction

- Stade : avant le stade floraison pour une restitution rapide des éléments nutritifs, détruire minimum 60 jours avant l'implantation de la culture suivante afin d'éviter les faims d'azote
- Destruction : mécanique (rouleaux, déchaumage, labour...)
- Sensibilité au gel : Gélif à partir de -7 °C

Mécanisme de lutte

- Les moutardes sont par nature des plantes sensibles qui favorisent la multiplication du nématode de la betterave
- Les moutardes anti-nématodes sont spécialement sélectionnées pour jouer le rôle de plantes hôtes tout en bloquant l'évolution du parasite
- L'éclosion des œufs est stimulée par les exsudats racinaires, les larves se fixent sur les racines mais elles ne peuvent pas se nourrir donc meurent

Avantages

- Variété tardive
- Plante moins lignifiée facilitant la destruction (gel)
- Période de piégeage de l'azote plus longue
- Anti-nématode de classe H1
- Grand gabarit
- Couverture rapide du sol permettant un contrôle efficace des adventices
- Bonne production de biomasse