

# L'ESSENTIEL ORTIVA®

## LE FONGICIDE AU LARGE SPECTRE DES LÉGUMES



syngenta®

Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 - Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



ORTIVA essentiel légumes REF-959 07/2024. Annule et remplace toute version précédente. S.A. au capital de 103 516 413 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-com.: FR 11 443 716 832. Agrément MPO2249: distribution et application de produits phytopharmaceutiques. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer qu'il dispose bien des dernières informations réglementaires produits en consultant les fiches techniques sur notre site internet [www.syngenta.fr](http://www.syngenta.fr). Ce document ne revêt aucun caractère contractuel. Les contenus sont publiés à titre d'information. Les données qui y sont contenues ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit. Il se substitue à la consultation de l'étiquette. © 2024 Syngenta, P.A.O.



- **Composition :**  
250 g/l azoxystrobine
- **Formulation :**  
SC (*Suspension concentrée*)
- **Cultures homologuées :**  
voir détail au verso
- **Cibles :**  
voir détail au verso
- **ZNT Organismes aquatiques :**  
voir détail au verso.
- **DRE :** 6 heures en plein champ  
et 8 heures en milieu fermé
- **Emballages :**  
S-Pac® 1 litre et 5 litres

### LES AVANTAGES

- Large spectre maladies
- Utilisable sur de nombreux légumes
- Bonne efficacité produit
- Bonne résistance au lessivage



### MODE D'ACTION

- L'azoxystrobine, substance active d'**ORTIVA®**, empêche tout développement du champignon en bloquant la formation d'énergie au niveau des mitochondries. Elle intervient sur de nombreuses phases de développement du champignon : germination, mobilité des spores et croissance mycélienne.
- L'azoxystrobine présente un triple mode d'action : **diffusant, contact et effet translaminaire.**
- L'activité de l'azoxystrobine est strictement préventive.



### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Positionner **ORTIVA®** dans un programme en optimisant sa **polyvalence** sur l'ensemble des **maladies** visées.
- **ORTIVA®** sera **toujours appliqué préventivement** et non sur maladie déclarée.
- **ORTIVA®** s'utilise dans le cadre de **programmes** de protection incluant d'**autres familles chimiques**. Le nombre d'interventions est limité à 1/3 des applications fongicides.
- Respectueux de la faune auxiliaire, **ORTIVA®** peut être **recommandé dans des programmes de protection intégrée.**

Syngenta France S.A. - 1228, Chemin de l'Hobit - 31790 Saint-Sauveur France.  
S.A. au capital de 103 516 413 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-com.: FR 11 443 716 832.  
Agrément MPO2249: distribution et application de produits phytopharmaceutiques.

ORTIVA® - AMM N° 9700332 - Composition : 250 g/l azoxystrobine \* - P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe 1 Pour protéger les eaux souterraines, suite à une utilisation sur pomme de terre, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de l'azoxystrobine plus d'une fois tous les deux ans. SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit plus d'une fois par an sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 % pour les usages sur « graines protéagineuses » d'hiver. SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit plus d'une fois par an sur sols artificiellement drainés pour les usages sur « graines protéagineuses » de printemps, « haricots écossés frais », « haricots et pois non écossés frais », « légumineuses potagères sèches » et « pois écossés frais ». SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sols artificiellement drainés pour les usages sur pomme de terre, « artichaut », « chicorées - production de racines », « choux à inflorescence », « choux pommés », « choux feuilus », cultures florales et plantes vertes, fines herbes, « oignon », « poireau », infusions, « laitues » et PPAM non alimentaires. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau pour les usages sur « artichaut », asperge, « carottes », « chicorées-production de racines », « céleri-brancher », « choux à inflorescence », « choux pommés », « choux feuilus », « cucurbitacées à peau comestible », « cultures florales et plantes vertes », « fines herbes », fraises, « cucurbitacées à peau non comestible », « navet » en plein champ, « poivron », « oignon », « poireau », « salsifis », infusions, « laitues » et PPAM non alimentaires. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages sur radis sous abri ouvert au moment du traitement et sur « arbres et arbustes d'ornement ». SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages sur pomme de terre et « pavot ».

\* Marque enregistrée et \* substance active d'une société du groupe Syngenta.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <https://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l'étiquette du produit ou [www.syngenta.fr](http://www.syngenta.fr).



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

En cas d'incident, appeler le numéro d'urgence Syngenta **0 800 803 264** Service & appel gratuits

Renseignements Techniques **0 825 00 05 52** Service 0,15 €/min \* prix appel  
[renseignements.techniques@syngenta.com](mailto:renseignements.techniques@syngenta.com)

| CULTURES AUTORISÉES, UNIQUEMENT***                                                                                  | CIBLES                                                                                                          | DOSES AUTORISÉES | NB D'APPLI MAX.<br>PAR AN ET PAR CULTURE | ZNT AQUATIQUE¹ / DVP²        | DÉLAIS AVANT RÉCOLTE                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| CULTURES LÉGUMIÈRES                                                                                                 |                                                                                                                 |                  |                                          |                              |                                                 |
| Artichaut                                                                                                           | Mildiou, Oïdium                                                                                                 | 1 l/ha           | 2 /an*                                   | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 7 jours                                         |
| Asperge                                                                                                             | Rouille, <i>Stemphylium vesicarium</i>                                                                          | 1 l/ha           | 2 /an                                    | 20 mètres dont DVP 20 mètres | BBCH 89 - Application après récolte des turions |
| Cardon                                                                                                              | Mildiou - Oïdium                                                                                                | 1 l/ha           | 2 /an*                                   | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 14 jours                                        |
| Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Persil à grosse racine, Cerfeuil tubéreux, Salsifis, scorsonère | Alternaria, Septoriose, Maladie des taches foliaires, Oïdium                                                    | 1 l/ha           | 3 /an                                    | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 14 jours                                        |
| Céleri-branche                                                                                                      | <i>Cercosporidium punetum</i> , Maladie des taches foliaires, <i>Phomopsis</i> , Septoriose, <i>Stemphylium</i> | 1 l/ha           | 3 /an                                    | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 14 jours                                        |
| Chicorée Witloof - Production de Chicons ( <i>endive</i> ), Pissenlit <i>Uniquement sous abri</i>                   | Mildiou ( <i>pulvérisation du collet</i> )                                                                      | 1 ml/m²          | 1 /an                                    | -                            | 21 jours                                        |
| Chicorées Witloof - Production de racines ( <i>endive</i> ), Chicorée à café                                        | Rouille, Oïdium, Alternaria                                                                                     | 1 l/ha           | 2 /an*                                   | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 14 jours                                        |
| Chou-fleur, Brocoli, Chou verts ( <i>type non pommés</i> ), Chou chinois, Chou pommés, Chou de Bruxelles            | Alternaria, <i>Mycosphaerella brassicicola</i> ( <i>en préventif</i> ), Rhizoctone, Phoma lingam                | 1 l/ha           | 2 /an*                                   | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 14 jours                                        |
| Concombre, Courgette, Cornichon <i>Également autorisé sous abri</i>                                                 | Alternaria, Anthracnose, Cladosporiose, Mildiou, <i>Mycosphaerella citrulina</i> , Oïdium                       | 0,8 l/ha         | 3 /an                                    | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 3 jours                                         |
| Fenouil                                                                                                             | <i>Cercosporidium punetum</i> , Maladie des taches foliaires, <i>Phomopsis</i> , Septoriose, <i>Stemphylium</i> | 1 l/ha           | 3 /an                                    | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 14 jours                                        |
| Fraisier <i>Également autorisé sous abri</i>                                                                        | Oïdium                                                                                                          | 0,8 l/ha         | 3 /an                                    | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 3 jours                                         |
| Fève sèche, Haricot sec, Pois sec, Pois chiche sec                                                                  | Anthracnose, Pourriture grise, Sclérotinioses                                                                   | 0,8 l/ha         | 2 /an**                                  | 5 mètres dont DVP 5 mètres   | 35 jours                                        |
|                                                                                                                     | Rouilles                                                                                                        | 1 l/ha           |                                          |                              |                                                 |
| Flageolet, Fève                                                                                                     | Rouille                                                                                                         | 0,8 l/ha         | 2 /an**                                  | 5 mètres dont DVP 5 mètres   | 14 jours                                        |
|                                                                                                                     | Alternaria, Anthracnose                                                                                         | 1 l/ha           |                                          |                              |                                                 |
| Haricot vert                                                                                                        | Rouille                                                                                                         | 0,8 l/ha         | 2 /an**                                  | 5 mètres dont DVP 5 mètres   | 7 jours                                         |
|                                                                                                                     | Alternaria, Anthracnose                                                                                         | 1 l/ha           |                                          |                              |                                                 |
| Pois mange-tout                                                                                                     | Rouille                                                                                                         | 0,8 l/ha         | 2 /an**                                  | 5 mètres dont DVP 5 mètres   | 14 jours                                        |
|                                                                                                                     | Alternaria, Anthracnose                                                                                         | 1 l/ha           |                                          |                              |                                                 |
| Laitue, Scarole, Frisée, Mâche, Roquette <i>Également autorisé sous abri</i>                                        | Mildiou ( <i>Bremia</i> ), Oïdium,Cercosporiose                                                                 | 1 l/ha           | 2 /an*                                   | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 7 jours en plein champs<br>14 jours sous abri   |
| Lentille sèche                                                                                                      | Pourriture grise, Sclérotinioses                                                                                | 0,8 l/ha         | 2 /an**                                  | 5 mètres dont DVP 5 mètres   | 35 jours                                        |
|                                                                                                                     | Anthracnose, Rouilles                                                                                           | 1 l/ha           |                                          |                              |                                                 |
| Melon, Pastèque, Potiron, Potimarron <i>Également autorisé sous abri</i>                                            | Anthracnose, Cladosporiose, <i>Mycosphaerella citrulina</i> , Oïdium, Mildiou                                   | 0,8 l/ha         | 3 /an                                    | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 3 jours                                         |
| Navet, Radis, Rutabaga                                                                                              | Mildiou, Rouille blanche                                                                                        | 0,8 l/ha         | 2 /an                                    | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 14 jours                                        |
| Radis**** <i>Uniquement sous abri</i>                                                                               | Mildiou                                                                                                         | 0,8 L/ha         | 1 /an                                    | 20 mètres                    | 21 jours                                        |
| Oignon, Ail, Échalote                                                                                               | Rouille de l'ail, Hétérosporiose, Mildiou, <i>Stemphylium</i> , Pourriture grise, Sclérotinioses                | 1 l/ha           | 3 /an*                                   | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 14 jours                                        |
| Poireau                                                                                                             | Alternaria, Mildiou, Rouille                                                                                    | 1 l/ha           | 3 /an*                                   | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 21 jours                                        |
| Oignon de printemps, Ciboule                                                                                        | Alternaria, Mildiou, Rouille                                                                                    | 1 l/ha           | 3 /an*                                   | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 7 jours                                         |
| Pois écosé frais                                                                                                    | Anthracnoses, Mildiou, Pourriture grise, Sclérotinioses                                                         | 0,8 l/ha         | 2 /an**                                  | 5 mètres dont DVP 5 mètres   | 14 jours                                        |
|                                                                                                                     | Oïdium, Rouille                                                                                                 | 1 l/ha           |                                          |                              |                                                 |
| Poivron, Piment <i>Également autorisé sous abri</i>                                                                 | Alternaria, Cladosporiose, Oïdium                                                                               | 0,8 l/ha         | 2 /an                                    | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 3 jours                                         |
|                                                                                                                     | Mildiou                                                                                                         | 1 l/ha           |                                          |                              |                                                 |
| Pomme de terre <i>Pulvérisation en raie de plantation</i>                                                           | Champignons autres que pythiacées                                                                               | 3 l/ha           | 1 application tous les 2 ans*            | 5 mètres                     | BBCH 00                                         |
| Tomate, Aubergine <i>Uniquement sous abri</i>                                                                       | Alternaria, Cladosporiose, Oïdium                                                                               | 0,8 l/ha         | 3 /an                                    | -                            | 3 jours                                         |
|                                                                                                                     | Mildiou                                                                                                         | 1 l/ha           |                                          |                              |                                                 |

GRAINES PROTÉAGINEUSES

|                                                     |                               |          |                                                                                                                                                                                                                               |                            |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Pois protéagineux, Pois fourrager, Féveroles, Lupin | Anthracnose, Pourriture grise | 0,8 l/ha | 2 /an : Cultures d'hiver : une application par an sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 %.<br>Cultures de printemps : une application par an sur sols artificiellement drainés. | 5 mètres dont DVP 5 mètres | 35 jours |
|                                                     | Rouille                       | 1 l/ha   |                                                                                                                                                                                                                               |                            |          |

PPAMC<sup>(1)</sup>

|                                                                                  |                                                                                  |        |        |                              |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Fines Herbes ( <i>y compris stevia</i> ), <i>Également autorisé sous abri</i>    | Maladies des taches foliaires, Mildiou, Oïdium, Pourriture grise, Sclérotinioses | 1 l/ha | 2 /an* | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 7 jours en plein champ - 14 jours sous abri |
| Infusions ( <i>séchées</i> ) de feuilles et fleurs <i>Uniquement plein champ</i> | Maladies fongiques                                                               | 1 l/ha | 2 /an* | 20 mètres dont DVP 20 mètres | 7 jours                                     |
| Pavot, Œillette                                                                  | Maladies des taches foliaires, Mildiou, Pourriture grise, Sclérotiniose          | 1 l/ha | 2 /an  | 5 mètres                     | 42 jours                                    |
| PPAM - non alimentaires <i>Également autorisé sous abri</i>                      | Maladies fongiques                                                               | 1 l/ha | 2 /an* | 20 mètres dont DVP 20 mètres | -                                           |

<sup>1</sup>ZNT aquatique : Zone Non Traitée par rapport à un point d'eau temporaire ou permanent. - DVP : Dispositif Végétalisé Permanent.  
\* Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés - \*\* Une application par an sur sols artificiellement drainés - \*\*\* Sans indication les usages sont autorisés en plein champ uniquement.  
\*\*\*\*Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité.  
<sup>(1)</sup>PPAMC : Plantes à Parfum, Aromatiques, Médicinales et Condimentaires.

Pour l'ensemble des cultures, stades d'application, usage homologués et autres préconisations d'emploi, se reporter à l'étiquette du produit ou consulter : [www.syngenta.fr](http://www.syngenta.fr)