

Basfoliar® Zn Premium SL

Engrais liquide à base de zinc, de manganèse, de molybdène et d'*Ecklonia maxima*



Basfoliar® Zn Premium SL est un engrais foliaire liquide riche en **oligo-éléments**. Grâce à sa formulation issue de notre technologie *Leaf Care* et à son effet **d'acidification du pH**, l'absorption des nutriments par les feuilles est maximale.

L'objectif est de fournir - à des moments clefs où les besoins sont les plus importants - les bons éléments pour **améliorer la récolte**.



ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NFU 44-204

Engrais azoté en solution (N) 4,3 avec manganèse, molybdène, zinc (PFC 1(C)(I)(b)(II)) et avec additif agronomique à base d'extrait d'algues et d'acides aminés



Bidon de 10 L

Densité : 1,33

	Poids/Poids	Poids/Volume
Azote (%)	4,2	5,6
Manganèse (%)	0,76	1
Molybdène (%)	0,22	0,3
Zinc (%)	7,9	10,5
Basfoliar® Kelp (<i>Ecklonia maxima</i>)	8	10,6
Basfoliar® Vitality (acides aminés)	17	22,6

La qualité des matières premières utilisées permet de pulvériser sur les fruits jusqu'à quelques jours avant la récolte sans risque de résidus.



La gamme Basfoliar® Premium est caractérisée par la technologie Leaf Care

- 🛡️ Application sûre (pas de tâches, pas de phytotoxicité)
- ♻️ Faible teneur en métaux lourds
- ⚖️ Apport efficace en nutriments (optimisé par l'effet tampon du pH)
- 🌱 Source de carbone : améliore l'absorption des nutriments
- 💧 Co-adjuvants : ralentit l'évaporation de la solution sur la feuille, améliore l'absorption et sécurise l'application

➔ Gage de sécurité et d'efficience

Basfoliar® Zn Premium

- ✓ Favorise les réactions enzymatiques et la synthèse des hormones
- ✓ Excellente miscibilité, absorption par les plantes et sécurité pour les cultures
- ✓ Richesse en *Ecklonia maxima* (riche en auxines – effet boosteur des racines) et acides aminés (vigueur)
- ✓ Favorise un fonctionnement optimal des cultures

🔑 Les cultures à exigence élevée : lin, maïs, haricot, soja, fruitiers (agrumes).

Préconisations d'emploi :

- Ne pas appliquer en plein soleil ou en cas de forte chaleur
- Appliquer de préférence le matin ou le soir surtout en été
- Stocker à une température comprise entre +5 °C et +30 °C
- Eviter les fortes fluctuations de température
- Craint le gel
- Utilisation en mélange : respecter les spécifications du fabricant pour la miscibilité et la compatibilité. Dans tous les cas nous recommandons fortement d'effectuer au préalable un test de compatibilité/miscibilité/sélectivité du mélange avant une application à grande échelle.

Préconisations d'usage

Cultures	Doses d'emploi	Objectifs	Stades d'emploi
Grandes cultures (lin, maïs, haricot, soja, céréales, colza)	1 à 3L/ha	- Améliorer la protéosynthèse et photosynthèse (synthèse amidon) - Rôle spécifique dans le métabolisme de l'auxine (élongation cellulaire) -> synergie avec l' <i>Ecklonia maxima</i> - Meilleure assimilation et transport des oligo-éléments	Jusqu'à 4 passages, lors des traitements foliaires
Cultures pérennes	1 à 3L/ha		Jusqu'à 4 passages, à partir du stade apparition des feuilles
Cultures maraichères	1 à 2L/ha		Jusqu'à 3 passages, à partir du stade apparition des feuilles

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur www.quickfds.com

H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

DESTINÉ AUX USAGES PROFESSIONNELS