

Boiler® 800

HERBICIDE

+ Winshot™

HERBICIDE



Solution racinaire antigraminée + antidicotylédone complète en pré ou en post

SPECTRE OPTIMISÉ



**Solution complète en antigraminées
et antidicotylédones**

- Points forts antidicotylédones :



Gaillet

Séneçon
communCapselle bourse
à pasteur

Coquelicot



Matricaire

CHANTIERS OPTIMISÉS



**Association de 2 modes d'action
racinaires complémentaires apportant
efficacité et persistance sur
les adventices :**

- Un mode d'action unique (HRAC 29) à base d'Isoxaben contre les dicotylédones agissant sur l'hypocotyle
- Un mode d'action anti-graminées à base de prosulfocarbe

**Performances sur toutes céréales
d'hiver entre pré et post levée jusqu'à
3 feuilles**

CONDUITE OPTIMISÉES



**Une solution qui contribue à la
gestion des principales dicotylédones
résistantes sur le long terme**

Boiler™ 800 + Winshot™ offre un très bon contrôle des matricaires, séneçons, stellaires et coquelicots, même ceux résistants à d'autres modes d'action.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Winshot™ réduit le stock semencier des adventices principales (coquelicot, séneçon, matricaires).

Seuils de nuisibilité (-5 % rendement) :

Coquelicot : 22 p/m²

Séneçon : 30 p/m²

Matricaires : 22 p/m²

APPLICATIONS OPTIMISÉE



**Le duo gagnant pour votre
désherbage précoce**

Encadrement des applications de prosulfocarbe :

Utiliser un dispositif anti dérive homologué. En présence de cultures non-cibles à moins d'1 km, se référer à l'étiquette pour appliquer les recommandations nécessaires. Éviter toute dérive de pulvérisation vers les cultures voisines et l'environnement.



Fiche d'identité

	Winshot™	Boiler™ 800
AMM	N° 2250492	N° 2210230
Composition et mode d'action	Isoxaben 125 g/L Benzamide HRAC 29 Inhibiteur de la synthèse de la cellulose	Prosulfocarbe 800 g/L Thiocarbamates HRAC 15 Inhibiteur des acides gras à longue chaîne
Formulation	Suspension concentrée	Concentré émulsionnable (EC)
Classement	Attention, H410, EUH208	Attention. H304, H315, H317, H319, H410
ZNT/DVP	ZNT aquatique : 5 m	ZNT : 5 m / DVP : 5 m
DRE⁽¹⁾	6 heures après traitement	48 heures
RESTRICTIONS / DSPPR	SPe 2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45% pour les usages sur céréales d'hiver, «crucifères oléagineuses» et «graines protéagineuses» SPe 8 : Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison, ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes	
DAR	DAR-F ⁽²⁾	DAR-F ⁽²⁾
INSCRIPTION IFBM	Winshot™ est utilisable sur les orges destinées à la brasserie	Boiler™ 800 est utilisable sur les orges destinées à la brasserie

⁽¹⁾ DRE : Délai de Réentrée / ⁽²⁾ DAR-F = délai avant récolte en jour non fixé : respecter le stade limite d'application de la culture

Large spectre d'activité

Adventices		Winshot™ 0,6 + Boiler™ 3L
Graminées	Prélevée	Post-précoce
Agrostis		
Paturin		
Ray-rass		
Vulpie		
Vulpin		

Dicotyledones	Prélevée	Post-précoce
Capselle		
Chardon de Marie		
Coquelicot		
Fumeterre		
Gaillet (automne)		
Géranium spp		
Lamier pourpre		
Matricaire spp		
Pensée		
Rep colza		
Séneçon commun		
Stellaire		
Veroniques		

- Très sensible (> 95%)
- Sensible (85 - 95%)
- Moyennement sensible (60 - 84%)
- Peu sensible (< 60%)

Utilisation

Cultures	Dose	Stade	Précisions
Céréales d'hiver : Blé tendre d'hiver, blé dur d'hiver, triticale, épeautre et seigle d'hiver	Dose applicable au co-pack : 0,5 L de Winshot™ + 2,5 L de Boiler™ 800	Fenêtre d'application : post semi prélevée ou 1 à 3 feuilles (BBCH 13)	1 application par an maximum

Ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45% pour les usages sur céréales d'hiver, graminées fourragères et prairies.

Boiler™ 800 : EC - concentré émulsionnable, contenant 800 Grammes par litre de Prosulfocarb. AMM N° 2210230 - Globachem N.V.

Danger. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H315 - Provoque une irritation cutanée. H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 - NE PAS faire vomir. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 - Éliminer le contenu/réceptacle dans selon la réglementation en vigueur.

Winshot™ : SC - suspension concentrée (concentré fluidifiable), contenant 125 Grammes par litre de Isoxaben. AMM N° 2250492 - Corteva Agriscience France S.A.S.

Attention. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. EUH208 - Contient du 1,2-benzothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation en vigueur.

Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, 3 Rond-Point des Saules - Immeuble Le Renaissance - 78280 Guyancourt. N° d'agrément 7800030 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. N° Vert 0800 470 810. ©TM Marques déposées.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.



Juin 2026