




UNE LONGUE DURÉE D'ACTION POUR DES FEUILLES VERTES PLUS LONGTEMPS ET PLUS DE RENDEMENT⁽¹⁾ SUR TOUTES VOS CÉRÉALES

- **CERATAVO® Era**, prêt à l'emploi, composé de **SOLATENOL® technology**, le standard technique SDHI et de prothioconazole.

Bénéfices de l'association Spectre d'efficacité sur blés et orges



Complémentarité des spectres et des modes d'action

Les deux produits possèdent des spectres d'activité larges sur les principaux pathogènes des céréales :

- L'association de **2 modes d'action différents** renforce l'efficacité et réduit le risque de développement de souches résistantes aux différentes familles de fongicides.
- Leurs **propriétés physico-chimiques complémentaires** permettent une protection optimale de la feuille.

POINTS FORTS

- Produit prêt à l'emploi et polyvalence toutes céréales.
- Spectre d'efficacité complet sur les maladies foliaires majeures des céréales.
- 6 à 7 semaines de protection.
- Haut niveau d'efficacité sur le complexe septoriose/rouilles.



Description de l'offre produits

À base de **SOLATENOL® technology** et de prothioconazole, **CERATAVO® Era**, solution prête à l'emploi, procure une protection sans équivalent contre les maladies foliaires majeures des céréales. Son excellente efficacité, combinée à une distribution uniforme et à une très forte affinité pour les tissus de la feuille, donnent à **CERATAVO® Era** une très longue durée d'action pour des feuilles vertes plus longtemps et plus de rendement⁽¹⁾.

DOSE D'APPLICATION RECOMMANDÉE		0,7 à 1 l/ha
EMBALLAGE EN 5 LITRES		Conditionné en
		

Produit	Cultures	CERATAVO® Era
N° AMM		2160959
Composition		SOLATENOL® technology (benzovindiflupyr) 75 g/l + prothioconazole 150 g/l
Formulation		EC (Concentré Emulsionnable)
Usages autorisés	Blés	Rouille(s), septorioses, fusarioses sur épis
	Épeautre	
	Orges	Rouille naine, rouille jaune, helminthosporiose, ramulariose, rhynchosporiose
	Seigles	Rhynchosporiose, rouille(s)
	Triticale	Rouille(s), septorioses, rhynchosporiose, fusarioses sur épis
	Avoine	Rouille couronnée
Dose homologuée		1 l/ha
Nombre d'application max :		1 app/ha/an
DAR		• Blés, épeautre, triticale, seigles : BBCH 69 max • Orges, avoine : BBCH 59 max
ZNT-DVP		• ZNT aquatique : 5 m • DVP : 5 m
DRE		48 heures



Les SDHI sont des molécules unisites dont le facteur de risque de développement de souches résistantes est moyen à élevé.

Il est indispensable de les appliquer une seule fois dans le cycle cultural, de toujours les associer avec un partenaire efficace et de positionner ces associations tôt dans le cycle des maladies afin de préserver l'efficacité des fongicides dans le temps.

Attention - H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Fiche technique CERATAVO Era Céréales_MWG CER_CP_31_06/2021 - Annule et remplace toute version précédente - Ce document ne peut aucun caractère contractuel - Les données qui y sont contenues ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications de produit, ni se substituer à la consultation de l'étiquette - L'appareil à l'utilisateur de s'assurer qu'il dispose bien des dernières informations réglementaires produites en consultant les fiches techniques sur notre site internet www.syngenta.fr © 2021 - P40