



CABRIO® DG

AMM n°2060086

Fongicide contre les maladies des orangers, poiriers, oliviers et des cultures légumières.

FICHE D'IDENTITÉ

Composition	pyraclostrobine 200g/Kg
Formulation	granulés à disperser dans l'eau (WG)
Température de stockage recommandée	Inférieur à 40°C
Densité	1.68
pH	env. 5 - 7 (CIPAC Eau standard D, 1 %(m), 20°C)
Délai avant rentrée	48h
Code UFI	TQN4-VK1A-E00N-R9JF
Classement	Attention

H332 : Nocif par inhalation.
H335 : Peut irriter les voies respiratoires.
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H361d : Susceptible de nuire au fœtus
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



SGH07



SGH09



SGH08

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cabrio DG est un fongicide polyvalent, à action préventive et curative. Grâce à son mode de diffusion locosystémique et translaminaire, Cabrio DG offre un très haut niveau de protection à la surface comme à l'intérieur des feuilles. Cette spécialité se caractérise par une grande rapidité d'action et une longue persistance contre les principales maladies des arbres fruitiers, des cultures légumières et des gazons.

USAGES AUTORISÉS

BASF ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau ci-dessous et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant son utilisation à d'autres usages tels que prévus par le catalogue des usages en vigueur.

Limites maximales de résidus : se reporter aux LMR définies au niveau de l'Union Européenne, consultable à l'adresse : <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls>

Cultures	Cibles	Dose	Nombre maximum d'applications Intervalle entre les applications	Stade d'application	DAR	ZNT aqua	DSR - DSPPR
Oranger	Maladies diverses	1,125 kg/ha	4/an 14 jours	Entre BBCH 31 et 85	7 j.	20 m	10 m incompressibles
Olivier	Maladie de l'œil de paon, Maladies des fruits	0,5 kg/ha	2/an 21 jours	Jusqu'au stade BBCH 71	F (BBCH 71)	20 m	10 m incompressibles
Poirier	Stemphyliose, tavelure(s)	0,5 kg/ha	2/an 8 jours	Entre BBCH 54 et 85	21 j.	20 m	10 m incompressibles
Concombre, courgette, cornichons et autres cucurbitacées à peau comestible Sous serre permanente	Mildiou(s)	0,5 kg/ha	3/an/culture 7 jours	Entre BBCH 11 et 89	2 j (DRE 48h)	5 m	3 m
Melon, pastèque, potiron et autres cucurbitacées à peau comestible Sous serre permanente	Mildiou(s)	0,5 kg/ha	3/an/culture 7 jours	Entre BBCH 11 et 89	3 j.	5 m	3 m

Epinard	Mildiou(s)	0,5 kg/ha	2/an/culture 10 jours	Entre BBCH 15 et 49	14 j.	5 m	3 m
Feuilles de bettes	Mildiou(s)	0,5 kg/ha	2/an/culture 7 jours	Entre BBCH 15 et 49	14 j.	5 m	3 m
Laitue, mâche et roquette	Mildiou(s)	0,5 kg/ha	2/an 14 jours	Entre BBCH 15 et 49	14 j.	5 m	3 m
Tomate, Aubergine Sous serre permanente	Mildiou(s) Oïdium(s)	0,5 kg/ha	3/an/culture 7 j.	Entre BBCH 11 et 89	3 j.	5 m	3 m
Gazons de graminées	Champignons (pythiacées); dollar spot; fil rouge; fusarioses, helminthosporioses, pyriculariose; maladies du feuillage; rhizoctone ; rouilles	1,25 kg/ha	2/campagne			50 m	10 m incompressibles
Usages autorisés dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009 *							
Artichaut *	Mildiou(s) Oïdium(s) Maladies des taches brunes	0,5 kg/ha	3/an/culture 7 j.	Entre BBCH 13 et 85	7 j.	5 m	3 m
Chou-fleur, Brocoli et autres choux à inflorescences *	Mildiou(s)	0,5 kg/ha	3/an 7 jours	Entre BBCH 20 et 49	7 j.	5 m	3 m
Choux pommé, choux de Bruxelles, et autres choux pommés *	Mildiou(s)	0,5 kg/ha	3/an 7 jours	Entre BBCH 20 et 49	7 j.	5 m	3 m
Fines herbes *	Maladies des taches foliaires Mildiou(s)	0,5 kg/ha	3/an/culture 7 j.	Entre BBCH 20 et 49	7 j.	5 m	3 m

*Pour les usages mineurs dont l'autorisation de mise sur le marché a été accordée dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité.

Avant tout emploi du produit, il est recommandé à l'utilisateur de s'assurer de son efficacité ou de l'absence de risques éventuels de phytotoxicité sur la culture.

SPe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas rejeter les eaux usées des serres hors sol directement dans les eaux de surface. Pour les usages sous serre permanente : peut porter atteinte aux insectes pollinisateurs et à la faune auxiliaire. Eviter toute exposition inutile.

Pour l'usage sur artichaut : Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones

de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l'arrêté du 20 novembre 2021 pour les usages caractérisés par « emploi possible ».

Spa1 : Pour éviter le développement de résistances à la pyraclostrobine, le nombre d'applications du produit Cabrio DG est limité à 2 applications maximum par cycle cultural sur le poirier. Afin de gérer les risques de résistance avec le produit, il est recommandé de suivre les limitations d'emploi par groupe chimique préconisées par la note nationale Tavelure du pommier.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau en cultures d'olivier, oranger et poirier et de 50 m en gazons de graminées.

SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages sur artichaut, choux à inflorescence, choux pommés, cucurbitacées à peau comestible, cucurbitacées à peau non comestible, épinard, fines herbes, laitue tomate et aubergine.

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. (Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes).

Protection des personnes présentes et des résidents: Pour les usages sur artichaut, choux à inflorescence, choux pommés, cucurbitacées à peau comestible, cucurbitacées à peau non comestible, épinard, fines herbes, laitue tomate et aubergine, respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement; et l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.

CONDITION D'EMPLOI

Olivier :

Dose d'emploi : 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur olivier pour lutter contre la maladie de l'œil de paon (*Spilocaea oleagina*) et l'antracnose (*Colletotrichum gloeosporioides*, *C. acutatum*) dans la limite de 2 applications maximum par an jusqu'au stade BBCH 71 (les fruits ont atteint 10% de leur taille finale).

Olives de table : 2 applications entre la fin de la récolte et le début de la floraison.

Olives à huile : 1 application en automne / hiver avec le fruit présent sur l'arbre (sans dépasser le stade BBCH 71) puis 2 applications maximum entre la fin de la récolte et le début de la floraison. (Ne pas dépasser 2 applications maximum par an).

Volume de bouillie : 700 à 1000 L/ha

Oranger :

Dose d'emploi: 1,125 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur oranger pour lutter contre l'alternariose, dans la limite de 4 applications maximum et au plus tard 7 jours avant la récolte; des stades BBCH 31 (début de la croissance des pousses : l'axe de la pousse devient visible) au stade BBCH 85 (la maturation est avancée : intensification de la coloration spécifique de la variété).

Poirier :

Dose d'emploi : 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser pour lutter contre la tavelure et la stemphyliose du poirier, dans la limite de 2 applications maximum par an et au plus tard 21 jours avant la récolte; des stades BBCH 54 (stade oreille de souris, les 1ères feuilles se séparent) au stade BBCH 85 (la maturation est avancée : intensification de la coloration spécifique de la variété).

Gazon de graminées :

Dose d'emploi : 1,25 kg/ha

Positionnement : Cabrio DG procure une efficacité optimale lorsqu'il est appliqué en début d'attaque des maladies, à l'apparition des symptômes. En cas de forte pression parasitaire, le traitement peut être renouvelé 2 à 3 semaines plus tard.

Volume de bouillie: 500 à 1000 L/ha – Pulvériser avec une rampe équipée de buses à jets plats (ou pinceaux) à une pression de 2 à 3 bars.

Pour l'ensemble des usages pour les cultures légumières et les fines herbes:

- Traiter en préventif; dès que les risques sont présents (suivre les Bulletins de Santé du Végétal), L'utilisation de Cabrio DG est déconseillée en cas de mildiou déclaré.
- Adapter les cadences de traitements en cas de forte pression parasitaire et selon les observations du Bulletin de santé du Végétal.
- Cabrio DG s'utilise préférentiellement en association avec un partenaire anti-mildiou d'une autre famille chimique.

Cucurbitacées à peau comestible (sous serre permanente) :

Dose d'emploi : 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur concombre, courgette, cornichons et autres cucurbitacées à peau comestible pour lutter contre le mildiou, dans la limite de 3 applications maximum et au plus tard 2 jours avant la récolte; des stades BBCH 11 (développement de la première feuille) au stade BBCH 89 (la maturation complète : atteinte de la coloration spécifique de la variété).

Cucurbitacées à peau non comestible (sous serre permanente) :

Dose d'emploi : 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur melon, pastèque, potiron et autres cucurbitacées à peau comestible pour lutter contre le mildiou, dans la limite de 3 applications maximum et au plus tard 3 jours avant la récolte; des stades BBCH 11 (développement de la première feuille) au stade BBCH 89 (la maturation complète : atteinte de la coloration spécifique de la variété).

Épinard:

Dose d'emploi : 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur épinard pour lutter contre le mildiou, dans la limite de 3 applications maximum et au plus tard 14 jours avant la récolte; des stades BBCH 15 (5 feuilles étalées) au stade BBCH 49 (taille typique de la récolte).

Feuille de bettes:

Dose d'emploi: 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur feuille de bête pour lutter contre le mildiou, dans la limite de 3 applications maximum et au plus tard 14 jours avant la récolte; des stades BBCH 15 (5 feuilles étalées) au stade BBCH 49 (taille typique de la récolte).

Laitue, mâche et roquette:

Dose d'emploi : 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur laitue, mâche et roquette pour lutter contre le mildiou, dans la limite de 3 applications maximum et au plus tard 14 jours avant la récolte; des stades BBCH 15 (5 feuilles étalées) au stade BBCH 49 (taille typique de la récolte).

Tomate, Aubergine (sous serre permanente):

Dose d'emploi : 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur tomate et aubergine pour lutter contre le mildiou et l'oïdium, dans la limite de 3 applications maximum et au plus tard 3 jours avant la récolte; des stades BBCH 11 (1 feuilles étalée) au stade BBCH 89 (la maturation complète : atteinte de la coloration spécifique de la variété).

Usages autorisés dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009

Pour les usages mineurs dont l'autorisation de mise sur le marché a été accordée dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité.

Avant tout emploi du produit, il est recommandé à l'utilisateur de s'assurer de son efficacité ou de l'absence de risques éventuels de phytotoxicité sur la culture.

Artichaut:

Dose d'emploi : 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur artichaut pour lutter contre le mildiou, l'oïdium et les maladies des taches brunes, dans la limite de 3 applications maximum et au plus tard 7 jours avant la récolte; des stades BBCH 13 (3 feuilles étalées) au

stade BBCH 85 (50% des fruits sont à maturité).

Choux à inflorescences:

Dose d'emploi : 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur chou-fleur, brocoli et autres choux à inflorescences pour lutter contre le mildiou, dans la limite de 3 applications maximum et au plus tard 7 jours avant la récolte; des stades BBCH 20 (début de formation des pousses latérales) au stade BBCH 49 (les têtes sont fermées, elle ont atteint la taille et la forme typique).

Choux à inflorescences:

Dose d'emploi : 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur Choux pommé, choux de bruxelles, et autres choux pommés pour lutter contre le mildiou, dans la limite de 3 applications maximum et au plus tard 7 jours avant la récolte; des stades BBCH 20(début de formation des pousses latérales) au stade BBCH 49 (les têtes sont fermées, elle ont atteint la taille et la forme typique).

Fines herbes:

Dose d'emploi : 0,5 kg/ha

Cabrio DG peut s'utiliser sur fines herbes pour lutter contre le mildiou et les maladies des tâches foliaires, dans la limite de 3 applications maximum et au plus tard 7 jours avant la récolte; des stades BBCH 20 (début de formation des pousses secondaire) au stade BBCH 49 (fin de developement des organes végétatifs).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

L'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en oeuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles. Le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage). Les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Caractéristiques des EPI		Protection de l'utilisateur pendant la phase de :					Protection du travailleur
		Préparation / Mélange / Chargement	APPLICATION AVEC :		Pulvérisateur à dos	Nettoyage	
			Pulvérisateur pneumatique ou atomiseur				
			Tracteur avec cabine	Tracteur sans cabine			
Gants en nitrile Réutilisables NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ou à usage unique (certifié EN 374-2)		✓ Réutilisables	✓ À usage unique si intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Les porter et les stocker à l'extérieur de la cabine après usage	✓ À usage unique si intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation	✓ Réutilisables	✓ Réutilisables	✓ Réutilisables en cas de contact avec la culture traitée
EPI Vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1		✓ EPI vestimentaire + EPI partiel	✓			✓ EPI vestimentaire + EPI partiel	✓
EPI Partiel blouse ou tablier à manches longues catégorie III type PB3 certifié EN 14605 + A1		OU				OU	
Combinaison de protection chimique catégorie III type 4 certifiées EN 14605 + A1:2009		Combinaison de Type 4 (selon le niveau de protection recommandé pendant l'application)		✓ Type 4 avec capuche	✓ Type 4 avec capuche	Combinaison de Type 4 (selon le niveau de protection recommandé pendant l'application)	
Protection Respiratoire demi-masque filtrant anti-aérosol (EN 149) de classe FFP3 ou demi-masque (EN 140) avec filtre anti-aérosol (EN 143) de classe P3		✓		✓ En cas d'exposition aux gouttelettes pulvérisées	✓		
Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3)		✓					
Bottes certifiées EN 13 832-3					✓		

Caractéristiques des EPI		PROTECTION DE L'OPERATEUR PENDANT LES PHASES DE :					Protection du travailleur
		Préparation / Mélange / Chargement	APPLICATION AVEC :			Nettoyage	
			Lance		Contact intense avec la végétation		
			Sans contact intense avec la végétation	Cultures basses (< 50 cm)			
			Cultures basses (< 50 cm)	Cultures hautes 5(> 50 cm)	Cultures hautes et basses		
Gants en nitrile NF EN ISO 374-1/A1		✓ Réutilisables	✓ Réutilisables	✓ Réutilisables	✓ Réutilisables	✓ Réutilisables	✓ Réutilisables en cas de contact avec la culture traitée
réutilisables NF EN 16523-1+A1 (type A)							
à usage unique NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C)							
EPI vestimentaire		✓ EPI vestimentaire	✓			✓ EPI vestimentaire	✓
conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1							
EPI Partiel							
blouse ou tablier à manches longues catégorie III type PB(3)		+				+	
Combinaison de protection chimique catégorie III type 3 ou 4 certifiées EN 14605 + A1:2009		OU		✓ Type 4 avec capuche	✓ Type 3 avec capuche	OU	
Protection Respiratoire		✓		✓	✓		
demi-masque filtrant anti-aérosol (EN 149) de classe FFP3 ou demi-masque (EN 140) avec filtre anti-aérosol (EN 143) de classe P3							
Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3)							
Bottes			✓	✓	✓		
certifiées EN 13 832-3							

Caractéristiques des EPI		PROTECTION DE L'OPERATEUR PENDANT LES PHASES DE :				Protection du travailleur
		Préparation / Mélange / Chargement	APPLICATION AVEC		Nettoyage	
			Pulvérisateur à rampe			
			Tracteur avec cabine	Tracteur sans cabine		
Gants en nitrile Réutilisables NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ou à usage unique (certifié EN 374-2)		✓ Réutilisables	✓ À usage unique si intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Les porter et les stocker à l'extérieur de la cabine après usage	✓ À usage unique si intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation	✓ Réutilisables	✓ Réutilisables en cas de contact avec la culture traitée
EPI Vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1		✓	✓	✓	✓	✓
EPI Partiel blouse ou tablier à manches longues catégorie III type PB3 certifié EN 14605 + A1		✓			✓	
Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3)		✓				
Protection Respiratoire demi-masque filtrant anti-aérosol (EN 149) de classe FFP3 ou demi-masque (EN 140) avec filtre anti-aérosol (EN 143) de classe P3		✓		✓ En cas d'exposition aux gouttelettes pulvérisées		

Rapporter les équipements de protection individuelle (EPI) usagés dans un sac translucide à votre distributeur partenaire ECO EPI ou faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination de produits dangereux.

MODE D'ACTION

pyraclostrobine

Elle affecte les processus respiratoires et la production d'énergie du champignon parasite, au niveau du complexe du cytochrome bc1 (Complexe III) qui intervient dans le mécanisme de respiration mitochondriale. La pyraclostrobine se fixe solidement dans la cuticule foliaire et pénètre dans la feuille. Dans les tissus, la pyraclostrobine diffuse localement et de façon translaminaire. La pyraclostrobine est active, lorsqu'elle est appliquée en préventif. Elle inhibe très fortement la germination et la pénétration des spores et bloque le développement du mycélium. Elle appartient au groupe 11 [QoI : Quinone outside Inhibitors] de la classification FRAC.

CONDITION D'APPLICATION

- Pour suivre l'évolution du (ou des) pathogènes sur votre secteur, reportez-vous au Bulletin de Santé du Végétal, ou à tout autre dispositif d'information sur les pressions parasitaires mis en œuvre au niveau de votre région et réalisez un suivi régulier de vos parcelles.
- La qualité de la pulvérisation (répartition homogène de la bouillie) et les conditions météorologiques au moment de l'application (température < 25 °C et hygrométrie > 70 %) participent à la réussite du traitement.
- Traiter par temps calme, en absence de vent afin d'éviter toute dérive de bouillie sur les cultures voisines.

COMPATIBILITÉ

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.

RÉSISTANCE

L'utilisation répétée, sur une même parcelle, de la même préparation ou de préparation à base de substances actives de la même famille chimique ou ayant le même mode d'action, peut conduire à la sélection d'individus résistants. Pour réduire ce risque, l'utilisateur doit raisonner en premier lieu les pratiques agronomiques et respecter les conditions d'emploi de la préparation (dose, nombre d'application, cadence et séquence des traitements). Il est conseillé d'alterner ou d'associer, sur une même parcelle, des préparations à base de substances actives de familles chimiques différentes ou à modes d'action différents, tant au cours d'une saison culturale que dans la rotation. En dépit du respect de ces règles, on ne peut pas exclure une altération de l'efficacité de cette préparation. De ce fait, BASF décline toute responsabilité quant à d'éventuelles conséquences qui pourraient être dues à de telles résistances.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE

Remplir la cuve aux $\frac{3}{4}$ du volume d'eau nécessaire.

Mettre l'agitation en marche, verser la quantité de produit nécessaire, puis compléter avec de l'eau jusqu'au volume final.

Rincer le bidon manuellement 3 fois à l'eau claire en l'agitant et en veillant à verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur, ou rincer 2 fois de suite pendant au moins 30 secondes à chaque fois avec le rince-bidon du bac incorporateur (ou rince-bidon indépendant). Laisser égoutter les bidons.

Laisser l'agitateur en fonctionnement pendant le trajet et jusqu'à la fin de la pulvérisation.

Avertissements et Précautions générales d'emploi

Remarques générales concernant tous les produits

Avertissements :

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consulter <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr et/ou www.phytostimdata.com.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette. Respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés, sur l'emballage : ils ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé.

Sur ces bases, conduisez la culture et les traitements selon les bonnes pratiques agricoles, en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces...

BASF rappelle que toute utilisation pour un usage non autorisé et non conforme à nos préconisations est interdite.

BASF garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine ainsi que leur conformité à l'Autorisation de Mise en Marché délivrée par les Autorités compétentes françaises.

NB : Compte tenu de la diversité des législations existantes, il est recommandé dans le cas où les denrées issues des cultures protégées avec cette spécialité sont destinées à l'exportation, de vérifier la réglementation en vigueur dans le pays importateur.

Précautions générales d'emploi

PAR RAPPORT A LA QUALITÉ DU PRODUIT

Pendant le stockage

Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, sous clef, dans le local spécifiquement prévu à cet effet. Local ventilé, frais, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux. Vérifier sur l'emballage les températures de stockage propres au produit.

Conserver hors de la portée des enfants.

NUMERO D'URGENCE

En cas d'incident ou d'accident, appeler le 01 49 64 57 33

Fiche de données de sécurité disponible sur www.basf-agro.fr ou www.quickfds.com

Pour tous renseignements complémentaires :

0 800 100 299 Service & appel gratuits

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS: UTILISER LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

PAR RAPPORT AUX MELANGES

Extrait de l'Avis aux opérateurs responsables de la mise sur le marché, aux distributeurs et aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques" (J.O n° 221 du 21 septembre 2002). "Un mélange de produits phytopharmaceutiques consiste à associer, dans le cadre des pulvérisations, plusieurs spécialités phytopharmaceutiques. La technique des mélanges est mise en œuvre sur le terrain pour des considérations techniques (lutte simultanée contre plusieurs organismes nuisibles pouvant être présents concomitamment, recherche de réduction des doses, stratégie de gestion des résistances) ou économiques (réduction et optimisation du nombre de passages).

Selon l'arrêté du 07 avril 2010 modifié par l'arrêté du 12 juin 2015 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L.253-1 du code rural, tous les mélanges sont possibles **sauf ceux qui doivent faire l'objet d'une évaluation préalable** :

Les mélanges sont interdits **si l'un des produits** :



- porte le pictogramme SGH06 (mentions de danger associées H300, H301, H310, H311, H330 et H331)
- est classé avec une des mentions de danger suivantes : H340, H350, H350i, H360(FD, F, D, Fd, Df), H370 ou H372.

Les mélanges sont interdits **si les deux produits** :

- **ont chacun** une des mentions de danger suivantes :

	H341, H351, H371	H373	H361d, H361fd, H361f, H362
H341, H351, H371			
H373			
H361d, 361fd, H361f, H362			

Sont toujours interdits :

- Les mélanges comprenant au moins un produit de classe 4 pour les risques aquatiques ou terrestres dont la ZNT est de 100 m ou plus.
- Les mélanges entre un produit à base de pyréthri-noïde et un produit à base de triazole ou imidazolines en période de floraison ou au cours de périodes de production d'exsudats. Il faut d'abord traiter avec la spécialité à base de pyréthri-noïdes puis avec la triazole ou l'imidazole en respectant un délai de 24 heures entre les deux applications. Le produit de la famille des pyréthri-noïdes est obligatoirement appliqué en premier.

Pour tout mélange, il est conseillé d'effectuer un test préalable à petite échelle.

Dans le cas où d'autres préparations seraient associées au produit initial (insecticides, acaricides, fertilisants foliaires, correcteurs de carences, fongicides destinés à contrôler d'autres maladies, herbicides, etc...), tenir compte des caractéristiques propres à chacune des spécialités. Vérifier que l'époque d'intervention convient bien aux différentes spécialités (seuil de po-pulation ou stade du ravageur, du pathogène, de la culture etc.). De même, pour les condi-tions d'application.

Généralement, respecter l'ordre habituel d'introduction des spécialités dans la bouillie :

WG puis WP puis CS puis SC puis SE, puis EC puis EW, puis SL (adjuvant en dernier),

sauf si spécificités propres indiquée sur l'étiquette.

PAR RAPPORT À LA CULTURE

Utiliser les doses recommandées.

Traiter sur une culture en bon état de végétation, conduite dans de bonnes conditions correspondant à la variété choisie.

Avertissements et précautions générales d'emploi

Éviter l'entraînement du produit sur les cultures avoisinantes en ne traitant que par temps calme, sans vent, et à température adéquate.

PAR RAPPORT À L'UTILISATEUR

- Pendant toutes **les phases d'utilisation du produit**, respecter la réglementation en vigueur. Porter les Équipements de Protection Individuels (EPIs) requis. Ils sont systématiquement listés sur l'étiquette du ou des produits utilisés.
- Ne pas respirer les vapeurs lors de la préparation de la bouillie, ni le brouillard de pulvérisation.
- Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ne pas téléphoner pendant l'utilisation.
- Après application : nettoyer très soigneusement et rincer le pulvérisateur aussitôt après le traitement selon la réglementation en vigueur. Puis, changer de vêtements et prendre une douche.
- **Délai de rentrée** : Sauf dispositions prévues par les décisions d'autorisation de mise en marché visées à l'article L. 253-1 du code rural, le délai de rentrée minimal est de 6 heures et, en cas d'application en milieu fermé, de 8 heures. Il est porté à 24h après toute application de produit comportant une mention de danger : H318 - H315 - H319 et à 48 heures pour ceux comportant une mention de danger H317 - H334 - H340 - H341 - H350 - H350i - H351 - H360F -H360D - H360FD - H360Fd - H360Df - H361f - H361d - H361fd et H362.
- En cas de malaise ou d'intoxication, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

PAR RAPPORT À L'ENVIRONNEMENT

Préparation de la bouillie

Bien agiter le bidon avant de verser progressivement le produit dans le bac incorporateur ou la cuve du pulvérisateur remplie au 3/4, en maintenant l'agitation (sauf produits stipulés "sans agitation"). Dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, rincer 3 fois les emballages ou utiliser le rince-bidon du bac incorporateur et verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur.

S'il s'agit d'une formulation de type poudre ou granulés, verser le produit progressivement dans la cuve de manière à ce que ce dernier se dilue correctement dans l'eau.

Après toute application, il est indispensable de nettoyer très soigneusement le circuit du pulvérisateur afin d'éviter tout relargage ultérieur.

Conditions d'emploi

- Des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter l'entraînement des produits hors de la parcelle ou de la zone traitée.
- Ne pas traiter si le vent a un degré d'intensité > 3 sur l'échelle de Beaufort (19 km/h).
- Respecter l'ensemble des zones non traitées (aquatiques, terrestres, DSPPR)
- Élimination des eaux de rinçage du pulvérisateur et des fonds de cuve : se référer à la réglementation en vigueur.

Emballages vides : leur réutilisation est interdite.

Éliminer les emballages vides et les EPI via des collectes organisées par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR ou autre service de collecte spécifique.

**BASF Agricultural Solutions France SAS - 21 Chemin de la Sauvegarde
69134 ECULLY Cedex - Tel 04 72 32 45 45**

N° d'agrément : 6900059 —Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels

LES BONNS GESTES POUR TRAITER EN TOUTE SÉCURITÉ



► N'utilisez les produits phytopharmaceutiques que si nécessaire.



► Protégez votre santé et celle de votre entourage.



► Surveillez les conditions météorologiques.



► Protégez les points d'eau.



► Protégez les pollinisateurs.



► Préservez la faune sauvage.





D'INFOS SUR [HTTPS://PHYTEIS.FR/PHYTOPRATIQUE/](https://phyteis.fr/phytopratique/) : FLASHEZ-MOI