



FLOC



FLOCONNÉ



**COMPLÉMENTAIRE
DE FOURRAGES**



**TRAVAIL
OCCASIONNEL
À ACTIF**



**MATIÈRES
PREMIÈRES
locales**



Sécurité digestive (amidon raisonné < 26%)



Bien-être du microbiote digestif et équilibre de la flore



Apports d'oligo-éléments biodisponibles

Disponible
en **sac**, **vrac**
et **big bag**

Code produit : 8413400D98
Code EAN : 3280820002669

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur

cheval-alimentation.com



Scannez-ici !



FLOC

Aliment floconné complémentaire de fourrages

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéine brute.....	12.70 %
Matière grasse brute	3.50 %
Cellulose brute	11.30 %
Cendres brutes	9.40 %
Sodium	0.46 %
Calcium.....	1.50 %

ADDITIFS :

VITAMINES :

Vitamine A (3a672a)	10000 UI/kg
Vitamine D3 (3a671)	1200 UI/kg
Vitamine E (3a700i)	100 UI/kg

OLIGO-ÉLÉMENTS :

Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté 3b405)	20 mg/kg
Manganèse (oxyde de manganèse 3b502).....	40 mg/kg
Zinc (oxyde de zinc 3b603).....	60 mg/kg
Iode (iodate de calcium anhydre 3b202)	0.90 mg/kg
Sélénium (sélénite de sodium 3b801)	0.16 mg/kg
Cobalt (3b304)	0.31 mg/kg

Ingrédients : se référer sur les sacs ou bons de livraison



PROGRAMMES ALIMENTAIRES

Poids du cheval	Quantité à distribuer par jour
300 kg	1,95 à 3,9 kg (3 à 6 litres)
400 kg	2,6 à 4,55 kg (4 à 7 litres)
500 kg	3,25 à 5,2 kg (5 à 8 litres)
600 kg	3,9 à 5,85 kg (6 à 9 litres)

L'ensemble des rations sont préconisées sur la base d'un apport de foin minimum d'1 kg pour 100 kg de poids vif sur litière paille. Elles sont à moduler en fonction de la qualité et la quantité de fourrages disponibles ainsi que de l'état général et le niveau d'activité du cheval. En cas de litière artificielle, augmentez les apports en foin de 2 à 3 kg supplémentaires par jour. La distribution du nouvel aliment devra s'effectuer de façon progressive grâce à une transition avec le précédent aliment sur 8-10 jours minimum. Rations en 2 ou 3 repas par jour avec eau pure et tempérée à volonté.