

Luzar

Très grande 1ère exploitation !

3-6 mois

**SORGHO
FOURRAGER
MULTICOUPES
SUDAN GRASS X
BICOLOR**

fourrageres@eliard-spcp.fr

- Très grande 1ère exploitation
- Très bonne valeur alimentaire (0,86 UFL)
- Utilisable pour la méthanisation

Luzar



Caractéristiques :

- Très grande 1ère exploitation
- Excellent tallage, des feuilles larges et une faible teneur en lignine.
- Fort développement végétatif, très bon stay-green et un rendement exceptionnel.
- Utilisation possible en pâturage, en affouragement en vert, en enrubannage ou en ensilage.
- En période estivale LUZAR peut être exploité 2 à 3 fois sur la même saison.
- Fourrage très appétent, riche en énergie et en nutriments digestibles.

Résultats techniques :

Plateforme graminées estivales St Soule (17) du 08/10/2013, CAVAC (85)
Semis du 19/07/2013 à 20kg/ha, utilisation : ensilage

Produits	Rdt brut T/ha	Matière sèche (%)	MS T/ha
Luzar	28,11	22,08	6,21
Sorgho Sudan par Sudan	17,95	19,58	3,51
Moha Bigarré	11,94	23,12	2,76

Sac de 10kg

PMG : 30g

Spécificité :

- SORGHO FOURRAGER
- MULTICOUPES
- SUDAN GRASS X BICOLOR

Pérennité :

- 3-6 mois

Caractéristiques :

- Démarrage et installation rapides
- Importante 1ère coupe
- Culture dérobée
- Exploitation possible 50-60 jours après le semis
- Excellente vigueur de repousse

Dose de semis :

- 25-30 kg/ha
- Association possible avec le mélange Olympik : 20 kg/ha de Luzar et 10 kg/ha d'Olympik

Périodes de semis :

- De mai à mi-juillet

Profondeur de semis :

- Semer en ligne à 2-3 cm de profondeur avec un semoir à céréales

Types de sol :

- Tous types de sol

Conseils techniques :

- Veiller à ce que la parcelle soit propre avant de semer pour limiter le salissement en début de cycle. Possibilité de réaliser un faux-semis ou désherbage en amont de l'implantation.
- Le lit de semences doit être bien rattaché en profondeur et fin en surface pour permettre un bon contact terre/graine.
- Roulage après semis conseillé pour uniformiser la levée.
- Pour une utilisation en pâturage, attendre une hauteur de végétation de 60 à 70 cm pour diminuer le risque lié à l'acide cyanhydrique. Exploitation avant épiaison.

Fertilisation :

- Tenir compte de la réglementation en vigueur.
- Raisonner en fonction des analyses de sols et des apports organiques
- Préconisation : 80 UN au semis

