




Lidea

FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

PROCÉ.MIX

Mélange pour céréales immatures

- Sécurise les stocks de fourrage
- Favorise la rumination
- Une solution économique


PROCÉ.MIX

Mélange pour céréales immatures



Composition du mélange

31%	Triticale	110	Plantes/m ² (150 kg/ha)
20%	Blé	65	
16%	Avoine	60	
16%	Pois fourrager	15	
7%	Pois protéagineux	7	
10%	Vesce	30	



L'essentiel

☛ Sécurise les stocks de fourrage

- ☛ Planter des mélanges (céréales + pois + vesce) destinés à être ensilés permet de s'affranchir du risque de sécheresse estivale.
- ☛ Les aptitudes fourragères de chacune des variétés composant **PROCÉ.MIX** ont été déterminantes afin d'optimiser la quantité et la qualité du fourrage récolté.
- ☛ **PROCÉ.MIX** permet d'élever significativement les valeurs alimentaires, comparé aux méteils classiques (+ 0,02 à 0,05 UF/kg de MS).

☛ Intérêt zootechnique

- ☛ Avec de faibles coûts en intrants, **PROCÉ.MIX** est une solution compétitive pour produire un fourrage abondant à moindre coût.
- ☛ Son intérêt est accru dès lors qu'il permet de bien valoriser toutes les UF ingérées par les animaux sans les gaspiller.

☛ Favorise la rumination

- ☛ **PROCÉ.MIX** offre un fourrage riche en fibres, favorable à la rumination et au bon fonctionnement du rumen (pH).

Il s'intègre aisément dans les systèmes fourragers :

- ☛ en complément de ration riche en amidon des animaux en production. Il permet de maintenir la bonne teneur en amidon de la ration (proche de 30 %) et favorise ainsi la bonne valorisation de l'énergie contenue dans la ration de base.
- ☛ comme fourrage principal distribué à des animaux à plus faibles besoins (génisses ou vaches tarées).

Conseils

☛ Conseils de culture

- ☛ Conservation par voie humide (enrubannage ou ensilage).
- ☛ Récolter lorsque le fourrage a atteint une teneur en matière sèche proche de 30-35 % (stade laiteux-pâteux) lorsque l'éleveur recherche de la fibre ou dès la floraison du triticale pour optimiser la teneur en azote (enrubannage).
- ☛ Réaliser l'ensilage en coupe directe (limite la perte des grains et le salissement par la terre).
- ☛ Le fourrage doit être haché finement (longueur des brins : 2 cm).

☛ Fertilisation

- ☛ Dans la majorité des cas, la fertilisation n'est pas nécessaire.
- ☛ En conditions limitantes, un apport de 50 U d'azote peut être fait au stade tallage ou en sortie d'hiver.

☛ Semis

- ☛ Densité : 150 kg/ha à 2-3 cm de profondeur
- ☛ Semer de préférence avant :

